

GUÍA ANIMALES DE COMPAÑÍA



Antibióticos



Nicilan® 40 mg / 10 mg Comprimidos para perros y gatos



COMPOSICIÓN:

Amoxicilina
(como trihidrato)
40 mg
Ácido clavulánico
(como clavulanato
de potasio)
10 mg

INDICACIONES: Tratamiento de infecciones bacterianas causadas por cepas productoras de β -lactamasas resistentes a la amoxicilina. Infecciones de las vías respiratorias, genitourinarias y digestivas. Infecciones de la piel y tejidos blandos.

POSOLÓGIA: Vía oral. 10 mg de amoxicilina + 2,5 mg de ácido clavulánico / kg de p.v. dos veces al día.

PRESENTACIÓN 10 x 12 comprimidos

Para más información: [Link Ficha Técnica](#)

Prescripción
veterinaria

Reg:
1418 ESP



Nicilan® 200 mg / 50 mg Comprimidos para perros



COMPOSICIÓN:

Amoxicilina
(como trihidrato)
200 mg
Ácido clavulánico
(como clavulanato
de potasio)
50 mg

INDICACIONES: Tratamiento de infecciones bacterianas causadas por cepas productoras de β -lactamasas resistentes a la amoxicilina. Infecciones de las vías respiratorias, genitourinarias y digestivas. Infecciones de la piel y tejidos blandos.

POSOLÓGIA: Vía oral. 10 mg de amoxicilina + 2,5 mg de ácido clavulánico / kg de p.v. dos veces al día.

PRESENTACIÓN 10 x 12 comprimidos

Para más información: [Link Ficha Técnica](#)

Prescripción
veterinaria

Reg:
1416 ESP



Nicilan® 400 mg / 100 mg Comprimidos para perros



COMPOSICIÓN:

Amoxicilina
(como trihidrato)
400 mg
Ácido clavulánico
(como clavulanato
de potasio)
100 mg

INDICACIONES: Tratamiento de infecciones bacterianas causadas por cepas productoras de β -lactamasas resistentes a la amoxicilina. Infecciones de las vías respiratorias, genitourinarias y digestivas. Infecciones de la piel y tejidos blandos.

POSOLÓGIA: Vía oral. 10 mg de amoxicilina + 2,5 mg de ácido clavulánico / kg de p.v. dos veces al día.

PRESENTACIÓN 10 x 12 comprimidos

Para más información: [Link Ficha Técnica](#)

Prescripción
veterinaria

Reg:
1415 ESP

Antiparasitarios Internos



Zipyran® Plus Sabor



COMPOSICIÓN:

Prazicuantel
50 mg
Pirantel
(embonato)
50 mg
Febantel
150 mg

INDICACIONES: Tratamiento de las principales parasitosis intestinales caninas producidas por los siguientes parásitos: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Echinococcus granulosus*, *Taenia hydatigena* y *Dipylidium caninum*.

POSOLÓGIA: Vía oral. En general la posología es de 5 mg de prazicuantel, 5 mg de pirantel (embonato) y 15 mg de febantel / kg p.v. (equivalente a 1 comprimido / 10 kg p.v.).

PRESENTACIÓN: 2 / 10 / 250 comprimidos

Para más información: [Link Ficha Técnica](#)

Prescripción
veterinaria

Reg:
1486 ESP



Zipyran® Plus Sabor perros grandes



COMPOSICIÓN:

Prazicuantel
175 mg
Pirantel
(embonato)
175 mg
Febantel
525 mg

INDICACIONES: Tratamiento de infecciones mixtas en perros causadas por nematodos y cestodos de las especies: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Echinococcus granulosus*, *Taenia hydatigena* y *Dipylidium caninum*.

POSOLÓGIA: Vía oral. En general la posología es de 5 mg de prazicuantel, 5 mg de pirantel (embonato) y 15 mg de febantel / kg p.v. (equivalente a 1 comprimido / 35 kg p.v.).

PRESENTACIÓN: 2 / 10 / 32 comprimidos

Para más información: [Link Ficha Técnica](#)

Prescripción
veterinaria

Reg:
2944 ESP



Zipyran®



COMPOSICIÓN

Prazicuantel
50 mg

INDICACIONES: Tratamiento de infestaciones causadas por los cestodos: *Echinococcus spp.* (*E. granulosus*, *E. multilocularis*), *Taenia spp.*, *Dipylidium caninum*.

POSOLÓGIA: La dosis recomendada es de 5 mg de prazicuantel / kg p.v. Esto equivale a 1 comprimido / 10 kg p.v. en una sola toma.

PRESENTACIÓN: 250 comprimidos

Para más información: [Link Ficha Técnica](#)

Prescripción
veterinaria

Reg:
11 ESP



Antiparasitarios externos

Effinol 2,5 mg/ml Solución cutánea



COMPOSICIÓN:
Fipronilo
2,5 mg

INDICACIONES: Tratamiento y prevención de infestación por pulgas (*Ctenocephalides spp.*) y garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) en perros. Tratamiento y prevención de infestación por pulgas (*Ctenocephalides spp.*) y garrapatas (*Rhipicephalus spp.*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes scapularis*, *Dermacentor variabilis*) en gatos. Se puede usar como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulgas (DAPP). Tratamiento de infestaciones por piojos en perros (*Trichodectes canis*) y gatos (*Felicola subrostratus*).

POSOLÓGIA: Aplicación tópica. Aplicar de 3 - 6 ml / kg p.v. (7,5 - 15 mg de sustancia activa / kg p.v.). La dosis puede alcanzarse con 6 - 12 pulverizaciones / kg p.v. del formato de 100 ml, o con 2 - 4 pulverizaciones del formato de 250 ml ó 500 ml.

PRESENTACIÓN: 100 ml / 250 ml / 500 ml

Para más información: [Link Ficha Técnica](#)

Sin
prescripción
veterinaria

Reg:
3103 ESP

MERLIN 1,04 g Collar medicamentoso Deltametrina

COMPOSICIÓN: Deltametrina 1,04 g.

INDICACIONES: Actividad de control continuo de pulgas (*Ctenocephalides felis*) durante 16 semanas; Actividad de control continuo de garrapatas (*Ixodes ricinus*) durante 6 meses; Actividad que impide la alimentación y favorece el control de flebótomos (*Phlebotomus perniciosus*) durante 5,5 meses.

POSOLÓGIA: Únicamente para uso externo y cutáneo. Se debe ajustar el collar alrededor del cuello del perro.

PRESENTACIÓN: 1 collar / 2 collares.




Retirar el collar de la bolsa protectora y ajustarlo al cuello del animal.



Deben caber 2 dedos de lado entre el collar y el cuello.



Cortar la parte sobrante superior a 5 cm.*



Para más información: [Link Ficha técnica](#)

*Controlar periódicamente y ajustar de modo sencillo presionando la parte superior de la hebilla y deslizando el collar en la posición correcta.

Acción 8 semanas
en pulgas

Rompe el ciclo con DYNACAN



DYNACAN Solución spot-on para gatos y hurones



COMPOSICIÓN:

Fipronilo
50,00 mg
(S)-metopreno
60,00 mg

INDICACIONES: **Gatos:** Para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas, solas o asociadas con garrapatas y/o piojos picadores. Eliminación de pulgas (*Ctenocephalides spp.*). Eliminación de garrapatas (*Ixodes spp.*, *Dermacentor spp.*, *Rhipicephalus sanguineus*). Eliminación de piojos picadores (*Felicola subrostratus*). **Hurones:** Para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas, solas o asociadas con garrapatas. Eliminación de pulgas (*Ctenocephalides spp.*).

POSOLÓGIA: Solución para unción dorsal puntual (spot-on). **Gatos:** Una pipeta de 0,5 ml por gato, correspondiente a la dosis mínima recomendada de 5 mg/kg de fipronilo y 6 mg/kg de (S)-metopreno. **Hurones:** Una pipeta de 0,5 ml por hurón. El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 2 semanas.

Para más información: [Link Ficha Técnica](#)

Sin
prescripción
veterinaria

Reg:
3857 ESP

DYNACAN Solución spot-on para perros



COMPOSICIÓN:

Fipronilo
100mg/ml
S-Metopreno
90mg/ml

INDICACIONES: Para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas, solas o asociadas con garrapatas y/o piojos picadores. Eliminación de pulgas (*Ctenocephalides spp.*). Prevención de la multiplicación de pulgas por inhibición del desarrollo de huevos (actividad ovicida) y de larvas y pupas (actividad larvicida). Eliminación de garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Eliminación de piojos picadores (*Trichodectes canis*).

POSOLÓGIA: Solución para unción dorsal puntual (spot-on).
1 pipeta de 0,67 ml para perros de 2 a 10 kg.
1 pipeta de 1,34 ml para perros de 10 a 20 kg.
1 pipeta de 2,68 ml para perros de 20 a 40 kg.
1 pipeta de 4,02 ml para perros de >40 kg.

PRESENTACIÓN: 3 pipetas (0,67 ml; 1,34 ml; 2,68 ml; 4,02 ml)

Para más información: [Link Ficha Técnica:](#)

[Dynacan 2-10 kg](#) - [Dynacan 10-20 kg](#) - [Dynacan 20-40 kg](#) - [Dynacan >40 kg](#)

Sin
prescripción
veterinaria

Reg:
3858 ESP
3859 ESP
3860 ESP
3861 ESP



Antiinflamatorios



Adocam® 1,5 mg/ml Suspensión oral para perros



COMPOSICIÓN:
Meloxicam
1,5 mg
(equivalente a
0,05 mg por gota)

INDICACIONES: Antiinflamatorio no esteroideo que alivia la inflamación y el dolor en trastornos músculo-esqueléticos agudos y crónicos.

POSOLÓGIA: Vía oral. El tratamiento inicial es una dosis única de 0,2 mg de meloxicam / kg p.v. el primer día. Continuar el tratamiento con una dosis de mantenimiento al día por vía oral (a intervalos de 24 horas) de 0,1 mg de meloxicam / kg p.v.


PRESENTACIÓN: 10 / 32 / 100 ml

Para más información: [Link Ficha Técnica](#)

Prescripción
veterinaria

Reg:
1901 ESP


ADOCAM®



Agitar bien



Extraer la dosis a
administrar



Servir sobre el
alimento



Caliercortin 4 mg/ml Solución inyectable



COMPOSICIÓN:
Dexametasona
(Dexametasona fosfato
sódico)
4 mg

INDICACIONES: Tratamiento paliativo de: Cetosis primarias. Artritis aguda, no infecciosa, tendovaginitis y bursitis. Enfermedades inflamatorias no infecciosas o alérgicas de la piel.

POSOLÓGIA: Vía IM, SC, IV. 0,1 – 0,25 mg dexametasona/kg peso corporal, equivalente a 0,025 – 0,063 ml medicamento veterinario por kg peso corporal.

PRESENTACIÓN: 10 / 50 ml

Para más información: [Link Ficha Técnica](#)

Prescripción
veterinaria

Reg:
3780 ESP



Retardoesteroide Suspensión inyectable



COMPOSICIÓN:
**Triamcinolona
acetónido**
2 mg

INDICACIONES: Inflamación originada por infecciones, alergias, traumatismos u otras etiologías.

POSOLÓGIA: Vía IM o SC. Perros y gatos: 0,05 - 0,1 ml / kg p.v. en dosis única. Vía IA o Intrasinovial. Perros y gatos: 0,5 - 1,5 ml / kg p.v. en dosis única.

PRESENTACIÓN: 50 ml

Para más información: [Link Ficha Técnica](#)

Prescripción
veterinaria

Reg:
510 ESP



Cardíacos



Banacep® Vet 5 mg Comprimido recubierto con película para perros y gatos



COMPOSICIÓN:

Benazepril
(equivalente a
clorhidrato de
benazepril 5 mg)
4,6 mg

INDICACIONES: **Perros:** Tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. **Gatos:** Reducción de la proteinuria asociada con la enfermedad renal crónica.

POSOLÓGIA: Vía oral, una vez al día. **Perros:** > 5 - 10 kg: 1/2 comprimido. > 10 - 20 kg: 1 comprimido. **Gatos:** > 2,5 - 5 kg: 1/2 comprimido. 5 - 10 kg: 1 comprimido.

PRESENTACIÓN: 14 comprimidos / 140 comprimidos

Para más información: [Link Ficha Técnica](#)

Prescripción
veterinaria

Reg:
1845 ESP



Banacep® Vet 20 mg Comprimido recubierto con película para perros



COMPOSICIÓN:

Benazepril
(equivalente a
clorhidrato de
benazepril 20 mg)
18,42 mg

INDICACIONES: En perros de más de 20 kg de peso corporal: Tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva.

POSOLÓGIA: Vía oral, una vez al día. **Perros:** 20 - 40 kg: 1/2 comprimido. > 40 - 80 kg: 1 comprimido.

PRESENTACIÓN: 14 comprimidos / 56 comprimidos

Para más información: [Link Ficha Técnica](#)

Prescripción
veterinaria

Reg:
2346 ESP

BANACEP®

**Aumenta su esperanza
y calidad de vida.**

	PESO (kg)	NÚMERO DE COMPRIMIDOS	
	>5-10 kg	1/2	BANACEP® Vet 5 mg 
	10-20 kg	1	BANACEP® Vet 5 mg 
	20-40 kg	1/2	BANACEP® Vet 20 mg 
	40 kg	1	BANACEP® Vet 20 mg 

	PESO (kg)	NÚMERO DE COMPRIMIDOS	
	2,5-5 kg	1/2	BANACEP® Vet 5 mg 
	5-10 kg	1	BANACEP® Vet 5 mg 



Reguladores funcionales

Indigest Solución inyectable



COMPOSICIÓN:
Menbutona
100 mg/ml

INDICACIONES: Normalizador de la función gástrica, duodenal y biliar. Está indicado en aquellos casos en que se requiere una estimulación de las secreciones digestivas: Indigestión, anorexia, envenenamiento, insuficiencia hepática y pancreática.

POSOLOGÍA: Vía IM o IV lento. 1 ml / 10 kg p.v. / día.

PRESENTACIÓN: 100 ml

Prescripción
veterinaria

Reg:
1018 ESP





Hormonales

Caliergolin 50 microgramos/ml Solución oral



Prescripción
veterinaria

Reg:
3520 ESP



COMPOSICIÓN:
Cabergolina
50 microgramos


INDICACIONES: Tratamiento de falsa gestación en perras. Supresión de la lactancia en perras y gatas (bajo ciertas circunstancias clínicas).

POSOLOGÍA: Vía oral. 5 microgramos por kg p.v. (equivalente a 1 ml de Caliergolin por cada 10kg/p.v.)


PRESENTACIÓN: 7 / 15 / 24 ml

CALIERGOLIN 50 MCG/ML


Alivia los signos de la
pseudogestación.




a. Retire la tapa del envoltorio del adaptador.



b. Conecte el adaptador al frasco hasta que la aguja penetre el tapón y el adaptador se fije en su lugar.



c. Retire el blíster y ajuste la jeringa al adaptador presionándola firmemente.



d. Extraiga el fármaco del frasco con la jeringa manteniendo el frasco boca abajo.



Sedantes



Sedin® 1 mg/ml Solución inyectable para perros y gatos



COMPOSICIÓN:

Medetomidina
0,85 mg
(equivalente a 1,0 mg
hidrocloruro de mede-
tomidina)

INDICACIONES: Sedación para facilitar la contención de los animales en exámenes clínicos, premedicación en una anestesia general

POSOLOGÍA: **Perros:** Sedación: 0,015 - 0,08 ml / kg p.v., IV, o 0,02 - 0,10 ml / kg p.v., IM; medicación previa: 0,1 ml a 0,4 ml / 10 kg p.v. **Gatos:** Sedación moderada a profunda y sujeción: 0,05 - 0,15 ml / kg p.v., IV, IM o SC.

PRESENTACIÓN: 10 ml

Prescripción
veterinaria

Reg:
2076 ESP



Antidorm 5 mg/ml Solución inyectable para perros y gatos



COMPOSICIÓN:

Atipamezol
4,27 mg
(equivalente a 5,0 mg
de hidrocloruro de
atipamezol)

INDICACIONES: Indicado para revertir los efectos de la sedación de la medetomidina y la dexmedetomidina en perros y gatos.

POSOLOGÍA: Vía IM. **Perros:** Administrar el mismo volumen previamente aplicado de Sedin®. **Gatos:** Administrar la mitad del volumen previamente aplicado de Sedin®.

PRESENTACIÓN: 10 ml

Prescripción
veterinaria

Reg:
2886 ESP



Release® 300 mg/ml Solución inyectable



COMPOSICIÓN:

Pentobarbital sódico
300 mg/ml

INDICACIONES: Eutanasia en los animales

POSOLOGÍA: **Perros:** Vía IV. Inyección continua hasta que el animal se duerma, después inyección rápida de la cantidad restante 150 mg / kg p.v. (equivalente 0,5 ml/kg p.v.). Intracardiaca, intrapulmonar e intraperitoneal 450 mg/kg p.v. (equivalente 1,5 ml / kg p.v.). **Gatos:** Vía IV. Inyección continua hasta que el animal se duerma, después inyección rápida de la cantidad restante 150 mg / kg p.v. (equivalente 0,5 ml/kg p.v.).

La inyección accidental es peligrosa. Reciba atención médica urgente.

PRESENTACIÓN: 50 ml / 100 ml / 12 x 100 ml

Prescripción
veterinaria

Reg:
3083 ESP



Xilagesic® 20 mg/ml Solución inyectable



COMPOSICIÓN:

Xilacina
20 mg

INDICACIONES: Sedación y manejo de animales. Procedimientos de diagnóstico, procesos quirúrgicos de corta duración, procesos quirúrgicos largos: como preanestésico para obtener una anestesia tanto local como general.

POSOLOGÍA: Vía IM. **Gatos:** 0,15 ml / kg p.v. **Perros:** 0,05 - 0,15 ml / kg p.v.

PRESENTACIÓN: 25 ml

Prescripción
veterinaria

Reg:
682 ESP

Dermatológicos



Adoderm



COMPOSICIÓN:

Biotina
2,0 mg
DL-metionina
3,0 mg
L-cistina
3,0 mg

INDICACIONES: Regenerador de pelo, piel y patas para perros y gatos. Complemento en período de muda para mejorar el aspecto animal.

MODO DE EMPLEO: Vía oral. Administrar 1 comprimido al día cada 15 kg de p.v. Perros y gatos de < 8 kg p.v.: 1 comprimido cada 2 días ó 1/2 comprimido al día.

PRESENTACIÓN: 25 comprimidos

Sin
prescripción
veterinaria



Adoeqmina®



COMPOSICIÓN:

**Clorhexidina
digluconato**
10 mg
Alcohol bencílico
0,02 ml

INDICACIONES: Desinfección de la piel, erosiones, pequeñas heridas, quemaduras leves y rozaduras.

MODO DE EMPLEO: Uso tópico. Use sin diluir. Limpie y seque el área a tratar antes de administrar el producto.

PRESENTACIÓN: 70 ml / 200 ml

Sin
prescripción
veterinaria

Reg:
384 ESP



Adofilm®



COMPOSICIÓN:

Alantoína
2 g
**Extracto fluido
de Centella asiatica**
2,1 g
**Extracto fluido
de Aloe vera**
0,07 g

INDICACIONES: Gel dermatológico que protege la piel y favorece la regeneración dérmica en perros y gatos.

MODO DE EMPLEO: Uso tópico. Limpiar cuidadosamente la zona de aplicación. Extender una fina capa uniforme del producto sobre la zona.

PRESENTACIÓN: Tubo de 60 g

Sin
prescripción
veterinaria

Reg:
11207



Adolac®



COMPOSICIÓN:

Ácido bórico
4 mg
Ácido salicílico
1,2 mg
Alcohol isopropílico
0,785 mg

INDICACIONES: Limpieza e higiene regular del oído externo.

MODO DE EMPLEO: Uso tópico. Agitar bien antes de usar. Aplicar una pequeña cantidad en el canal auditivo, haciendo posteriormente un masaje suave en la base de la oreja. Haga 1 ó 2 aplicaciones por semana.

PRESENTACIÓN: 125 ml

Sin
prescripción
veterinaria

Reg:
0160-H



Ado-Quatro S



COMPOSICIÓN:

Centella asiatica
20 mg/ml
Aloe vera
0,10 g

INDICACIONES: Prevención de las irritaciones de las almohadillas plantares de perros y gatos. Aumenta la resistencia al roce.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Uso tópico. Aplicar directamente sobre las almohadillas con el aplicador. Almohadillas irritadas: diariamente durante 1 - 2 semanas. Prevención: cada 2 - 3 días durante 3 semanas.

PRESENTACIÓN: Envase de 70 ml con aplicador

Sin
prescripción
veterinaria

Reg:
03925-H

Champús Dermatológicos

ACTIVIDAD
ANTISÉPTICA



Ado - Clorhexidina®



COMPOSICIÓN:
Clorhexidina
digluconato
20 mg/ml

INDICACIONES: Champú medicado para el tratamiento tópico de la pioderma canina causada por *Staphylococcus intermedius*, complementario de la oportuna terapia sistémica.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Uso tópico. 2 baños / semana durante 4 semanas.

PRESENTACIÓN: 250 ml

Sin
prescripción
veterinaria

Reg:
1482 ESP

EMOLIENTE
QUERATOPLÁSTICO



Dermitol



COMPOSICIÓN:
Ichtyol
0,5 g
Ácido salicílico
0,5 g
Aloe vera
0,04 g
Mentol
0,5 g

INDICACIONES: Champú queratoplástico, rehidratante y emoliente. Acondiona y regula la flexibilidad de la piel, contribuyendo a la corrección de procesos seboreicos y descamativos de la piel.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Uso tópico. 2 baños / semana, durante 3 - 6 semanas.

PRESENTACIÓN: 250 ml / 5 L

Sin
prescripción
veterinaria

Reg:
0089-H

EMOLIENTE
QUERATOLÍTICO



Elactil



COMPOSICIÓN:
Lactato de etilo
10 g
Lanolina
6 g
Aceite de jojoba
0,5 g

INDICACIONES: Champú antiséptico para la higiene y cuidado de la piel de perros y gatos, con propiedades queratolíticas y emolientes. Actúa limpiando la piel y el pelo del animal, disminuyendo el pH cutáneo y creando un medio adverso a las contaminaciones.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Uso tópico. 2 - 3 baños / semana, durante 4 semanas.

PRESENTACIÓN: 250 ml

Sin
prescripción
veterinaria

Reg:
0051-H

EMOLIENTE
ANTIPRURIGINOSO



Emoltan



COMPOSICIÓN:
Extracto de avena
2 g
Aloe vera
5 g
Mentol
0,5 g

INDICACIONES: Champú emoliente, hidratante y antiprurítico para perros y gatos. Puede ser utilizado como complemento para el tratamiento de otros problemas alérgicos de la piel y después de la aplicación de cualquier otro champú dermatológico.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Uso tópico. 1 - 2 baños / semana.

PRESENTACIÓN: 250 ml

Sin
prescripción
veterinaria

Reg:
0050-H

SUAVIDAD
EQUILIBRIO
NATURAL PIEL



NUEVO

Micotan



COMPOSICIÓN:
Lanolina, Centella
asiática, Piroctona
olamina, Zinc PCA,
Extracto de avena

INDICACIONES: Champú para perros y gatos que ayuda al mantenimiento de la piel y el pelo. Los ingredientes de MICOTAN contribuyen a mantener la suavidad, la hidratación y el equilibrio natural de la piel. Contiene tensoactivos suaves.

POSOLÓGIA: Uso tópico. 1 - 2 baños por semana.

PRESENTACIÓN: 250 ml

Sin
prescripción
veterinaria

Reg:
10254-H

Champús Higiene Kawu



Kawu® Champú Desodorante



COMPOSICIÓN:
Lauril éter sulfato sódico
18,9 g
Azul patente
2 mg
Tartracina
0,4 mg

INDICACIONES: Champú especialmente formulado para perros y gatos que, por cualquier circunstancia, necesiten baños más frecuentes. Limpia y elimina los malos olores del pelaje del animal.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Uso tópico. Mojar el pelo del animal con agua tibia. Verter el champú y masajear para obtener abundante espuma. Dejar actuar durante 5 minutos y enjuagar con abundante agua. Si es necesario, repetir el tratamiento cada 2 - 4 semanas.

PRESENTACIÓN: 250 ml / 5 L

Sin
Prescripción
veterinaria

Reg:
11180

Kawu® Champú 2 en 1



COMPOSICIÓN:
Lanolina 50%
1 g
Óxido de estearamina
0,5 g

INDICACIONES: Su fórmula enriquecida con aceite natural y acondicionador, limpia en profundidad, nutre, suaviza y fortalece todo tipo de pelaje. Facilita el peinado y ayuda a prevenir la formación de nudos.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Uso tópico. Aplicar en la piel del animal, previamente humedecida con agua tibia, masajear hasta que se obtiene espuma. Enjuagar con abundante agua

PRESENTACIÓN: 250 ml / 5 L

Sin
prescripción
veterinaria

Reg:
11179

Kawu® Champú de Visón



COMPOSICIÓN:
Aceite de visón
0,5 g
Tartracina
0,4 mg
Vehículo y estabilizante
c.s.p. 100 ml

INDICACIONES: Champú especialmente diseñado para perros de pelo largo. Gracias a su composición rica en aceite de visón, reestructura e hidrata la piel, deja el pelo brillante y suave, facilitando su peinado.

POSOLOGÍA: Uso tópico. Mojar el pelo con agua tibia y aplicar una cantidad suficiente de champú para crear espuma. Dejar actuar durante unos minutos y luego enjuagar bien con agua limpia.

PRESENTACIÓN: 250 ml

Sin
prescripción
veterinaria

Reg:
11178





Complementos nutricionales



Kawu® Calcio



COMPOSICIÓN:
Fosfato bicálcico de
Reg mineral,
Carbonato cálcico,
Vitamina A
25.000 UI / 100 g
Vitamina D3
4.000 UI / 100 g
Vitamina E
0,015 g / 100 g

INDICACIONES: Aporta el balance perfecto de calcio y fósforo esenciales para la formación de huesos y dientes fuertes y sanos. Está enriquecido con Vitamina D3 para facilitar la absorción intestinal de calcio y fósforo y ayudar a su correcto metabolismo.

POSOLOGÍA: Vía oral. 1 comprimido / 10 kg p.v.

PRESENTACIÓN: 100 comprimidos

Sin
prescripción
veterinaria



Kawu® Malta



COMPOSICIÓN:
Extracto de malta
Omega 3
Omega 6
Calcio
Fósforo

INDICACIONES: Complemento nutricional con múltiples beneficios para los gatos. Previene la formación de bolas de pelo en el estómago.

POSOLOGÍA: Vía oral. Gatos de pelo largo < 10 kg: 6 - 12 cm de Kawu Malta / día. Gatos de pelo corto < 10 kg: 4 - 8 cm de Kawu Malta / día.

PRESENTACIÓN: Tubo de 100 g

Sin
prescripción
veterinaria



Promotor® L 47.0



COMPOSICIÓN:
Vitaminas B1, B2, B6
Niacinamida,
D-pantenol B12
Biotina, Hidrolizado
de levaduras cultiva-
das sobre sustrato
vegetal, lisina, metio-
nina, dextrosa

INDICACIONES: Momentos de estrés, en desequilibrios y deficiencias nutritivas, en estados de depauperación, convalecencias, en periodos de gestación y lactancia.

POSOLOGÍA: Vía oral. 2 ml / 10 kg p.v. / día.

PRESENTACIÓN: 1 L / 5 L

Sin
prescripción
veterinaria



Promotor® 43

COMPOSICIÓN:
Vitaminas A, D3, E, K3,
B2, B1, B6, B12, C,
Niacina, Pantotenato
cálcico-D, Biotina,
Ácido Fólico,
Metionina, Lisina

INDICACIONES: Desequilibrios y deficiencias de aminoácidos o vitaminas.

POSOLOGÍA: 1 kg / Tonelada de pienso, durante 5 días.

PRESENTACIÓN: 100 g / 25 x 1 kg

Sin
prescripción
veterinaria



Despadac® Secure Plus



COMPOSICIÓN:

Didecil dimetil cloruro de amonio
10 %
Glutaraldehído
14 %

INDICACIONES: Limpieza y desinfección de locales, alojamientos, utensilios.

POSOLÓGIA: Locales y recintos: desinfección rutinaria: 25 - 30 ml en 10 L agua. Desinfección estricta: 70 - 100 ml en 10 L agua. Nebulización y termonebulización: 1 L en 3 L agua. Utensilios: 50 ml en 10 L agua.

PRESENTACIÓN: 1 L / 5 L

Sin
prescripción
veterinaria

Reg:
0362-P





calier.com

