

Vademécum Virbac 2020

Animales de compañía

Índice

Antiparasitarios

Biológicos

Dermatológicos

Farmacológicos

Higiene

Nutrición

Etología

Diagnóstico

Virbac responde

☎ 933 716 373 📞 616 764 990

virbac.responde@virbac.es

Virbac

ÍNDICE

ANTIPARASITARIOS

Externos

Effipro DUO
Effipro
Effitix
Prevender
Prevendog

Internos

Endogard
Milpro
Milteforan
Virbaminthe

Endectocidas

Evicto

BIOLÓGICOS

Vacunas

Canigen Cachorros 2b
Parvigen
Canigen MHL
Canigen MHPL
Canigen DHPPiL
Canigen DHPPi
Canigen L4
Rabigen
Feligen CRP
Leucogen
Leucofeligen FeLV/RCP

Otros biológicos

Virbagen Omega

DERMATOLÓGICOS

Alergias

Allermyl • Allercalm
Allerderm • Cortavance
Cyclavance

Desorden queratoseborreico

Sebomild

Infecciones cutáneas

Clearium

Otitis

Epi-otic • Easotic

FARMACOLÓGICOS

Analgesia

Carprox • Inflacalm
Tramvetol

Anestésicos y sedantes

Medetor • Revertor
Vetflurane • Zoletil

Antibióticos

Enrox • Rilexine

Antieméticos

Vetemex

Oftalmología

Soligental

Oncología

Stelfonta

Reproducción

Alizin • Contralac
Suprelorin • Ypozane

HIGIENE

Champú fisiológico
Limpiador auricular
Veggiedent FR3SH
Veggiedent Zen
Vet aquadent

NUTRICIÓN

Veterinary HPM

Gatos esterilizados

Baby Pre Neutered
Junior Neutered
Adult Neutered
Adult Salmon Neutered & Entire
Senior Neutered

Veterinary HPM

Perros esterilizados

Adult Neutered Small & Toy
Senior Neutered Small & Toy
Adult Neutered Large & Medium
Senior Neutered Large & Medium
Adult Neutered Sensitive Digest L & M

Veterinary HPM

Perros pequeños y miniatura

Baby Dog Small & Toy
Adult Dog Small & Toy
Senior Dog Small & Toy

Veterinary HPM

Perros grandes y medianos

Baby Dog Large & Medium
Junior Dog Special Medium
Junior Dog Special Large
Adult Dog Large & Medium
Senior Dog Large & Medium
Adult Sensitive Digest Large & Medium

Veterinary HPM

Dietetic Range. Gatos

U1 Struvite dissolution
U2 Dissolution & prevention
U3 Urinary WIB
W1 Weight loss & diabetes
W2 Weight loss & control
K1 Kidney support
G1 Digestive support
A2 Hypoallergy Food intolerance
D1 Dermatology support

Veterinary HPM

Dietetic Range. Perros

W1 Weight loss & diabetes
W2 Weight loss & control
J1 Joint & Mobility
A2 Hypoallergy Food intolerance
D1 Dermatology support
G1 Digestive support
K1 Kidney support
U1 Dissolution & prevention

Suplementos nutricionales

Nutribound
Nutri-plus gel
Pronefra

ETOLOGÍA

Anxitane

DIAGNÓSTICO

Enf. infecciosas felinas

Speed Duo FeLV/FIV
Speed F-Corona

Enf. infecciosas caninas

Speed Parvo

Enfermedades parasitarias y transmitidas por vectores

Speed Duo Leish K/Ehrli
Speed Leish K
Speed Ehrli
Speed Giardia
Speed Diro

Dermatología y antibiograma

Dermatophyttest
Speed Biogram

Reproducción

Ovulation Test
Odelis CPSE

Biomarcadores

Speed cCRP
Speed Cortisol
Speed CPSE
Speed Progesterone
Speed T4
Speed Reader

ÍNDICE ALFABÉTICO



ANTIPARASITARIOS

Externos

- ☒ Effipro DUO
- ☒ Effipro spray
- ☒ Effipro spot-on
- ☒ Effitix
- ☒ Prevender
- ☒ Prevendog

Internos

- ☒ Endogard Sabor
- ☒ Milpro
- ☒ Milteforan
- ☒ Virbaminthe

Endectocidas

- ☒ Evicto

EFFIPRO DUO

Antiparasitario externo en spot on con fipronilo y piriproxifeno



Composición

Fipronilo 100 mg/ml. Piriproxifeno 30 mg/ml.

Indicaciones

Elimina pulgas y garrapatas por contacto y proporciona 3 meses de protección frente a la proliferación de huevos de pulgas en perros y gatos. Elimina y mata las pulgas (acción insecticida). Elimina y mata las garrapatas (acción acaricida).

Propiedades

Pipeta con gran cobertura que permite atacar las fases clave del desarrollo de la pulga. Al romper el ciclo de la pulga, ayuda a prevenir reinfestaciones en el hogar. Cómodo para el propietario: aplicación una vez al mes. Pipeta antigoteo.

Observaciones No aplicar en lesiones o heridas. No usar en cachorros de menos de 10 semanas o 2 kg. No usar en gatos menores de 10 semanas de edad o en gatos que pesen menos de 1 kg. No repetir el tratamiento a intervalos menores de 4 semanas. Sólo para uso externo. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la boca. En caso de contacto accidental lavar con agua o consulte con el médico. Los animales tratados no deben manipularse ni permitir a los niños jugar con ellos hasta estar secos. **Reacciones adversas** Efectos cosméticos transitorios (aspecto húmedo o descamación ligera), reacciones cutáneas transitorias (descamación, alopecia local, prurito, eritema, decoloración de la piel) en punto de administración y prurito general o alopecia después del uso. En muy raras ocasiones, sialorrea, síntomas neurológicos reversibles (hiperestesia, depresión, síntomas nerviosos), síntomas respiratorios o vómitos. Conservar a temperatura inferior a 30 °C y en un lugar seco. **Nº de registro** Effipro DUO 50 mg/60 mg 3294 ESP. Effipro DUO 67 mg/20 mg 3290 ESP. Effipro DUO 134 mg/40 mg 3291 ESP. Effipro DUO 268 mg/80 mg 3292 ESP.

Posología y modo de empleo

Aplicar 1 pipeta al mes de la presentación correspondiente según peso del animal. Separar el pelaje hasta que la piel quede visible, colocar la pipeta y apretar para vaciar su contenido. Repartir en uno o dos puntos a lo largo del lomo, preferentemente en zonas donde el animal no pueda lamerlo.

Presentaciones

Gatos. Perros pequeños (entre 2 y 10). Perros medianos (entre 10 y 20 kg). Perros grandes (entre 20 y 40 kg). Perros muy grandes (entre 40 y 60 kg). Disponible en cajas de 4 pipetas.



EFFIPRO spray

Antiparasitario externo en solución para pulverización cutánea



Composición

Fipronilo 2,5 mg/ml.

Indicaciones

Elimina y mata las pulgas (acción insecticida).

Elimina y mata las garrapatas (acción acaricida).

Propiedades

4 semanas de protección para pulgas y garrapatas.

Cómodo para el propietario: aplicación una vez al mes.

Posología y modo de empleo

Spray 100 ml, 6-12 pulverizaciones/kg PV. Spray 250 ml, 2-4 pulverizaciones/kg PV.

Spray 500 ml, 1-2 pulverizaciones/kg PV. Pulverizar a contrapelo a una distancia de 10-20 cm hasta humedecer todo el pelaje. En la cabeza, aplicar con la mano tras pulverizar sobre los guantes. Dejar secar al aire (sin toalla).

Presentaciones

Envases de 100, 250 y 500 ml.



Contraindicaciones Animales enfermos o convalecientes. Conejos. Hipersensibilidad al producto. **Observaciones** Efecto remanente frente a pulgas: hasta 6 semanas en gatos y hasta 3 meses en perros; frente a garrapatas: hasta 4 semanas. Excepcionalmente se puede producir hipersalivación, signos neurológicos reversibles, vómitos, signos respiratorios, reacciones cutáneas locales, prurito o alopecia. Altamente inflamable. No conservar a temperaturas superiores a 25 °C. Proteger de la luz directa del sol. No superar la dosis recomendada. Evitar el contacto con los ojos. No pulverizar directamente donde la piel está lesionada. Dejar que los animales se sequen en un lugar ventilado. No bañar con champú los 2 días anteriores o posteriores al tratamiento. Evitar que los animales se laman después del tratamiento. Mantener a los animales tratados alejados del fuego o de otras fuentes de calor hasta que la piel esté seca. Vaporizar al aire libre o en lugar ventilado. No respirar el spray. No fumar, beber ni comer durante la aplicación. Usar con guantes. Lavar cualquier salpicadura con jabón. Las personas con asma pueden ser más sensibles al producto. Puede afectar a los organismos acuáticos. Evitar bañar al animal en cursos de agua durante los 2 días después de la aplicación. No se han hecho estudios específicos en hembras gestantes o en lactación. Eliminar los residuos según normativas locales evitando los cursos de agua. **Nº de registro** Effipro 2,5 mg/ml solución para pulverización cutánea para gatos y perros 2027-ESP.

EFFIPRO spot-on

Antiparasitario externo en solución tópica



Composición

Fipronilo 100 mg/ml.

Indicaciones

Elimina y mata las pulgas (acción insecticida). Elimina y mata las garrapatas (acción acaricida).

Propiedades

4 semanas de protección para pulgas y garrapatas. Cómodo para el propietario: aplicación una vez al mes. Pipeta antigoteo.

Posología y modo de empleo

Aplicar 1 pipeta al mes de la presentación correspondiente según peso del animal. Separar el pelaje hasta que la piel quede visible, colocar la pipeta y apretar para vaciar su contenido. Repartir en uno o dos puntos a lo largo del lomo, preferentemente en zonas donde el animal no pueda lamerlo.

Presentaciones

Gatos. Perros pequeños (entre 2 y 10). Perros medianos (entre 10 y 20 kg). Perros grandes (entre 20 y 40 kg). Perros muy grandes (entre 40 y 60 kg). Disponible en cajas de 4, 24 y 60 pipetas



Contraindicaciones Cachorros menores de 2 meses o 2 kg. Gatitos menores de 2 meses o 1 kg. Animales enfermos o convalecientes. Conejos. Hipersensibilidad al producto. **Observaciones** Efecto remanente hasta 8 semanas frente a pulgas y hasta 4 semanas contra garrapatas. Si el animal se lame, puede observarse hipersalivación. Pueden producirse reacciones locales, prurito, alopecia, signos neurológicos reversibles y vómitos. El intervalo mínimo entre dos tratamientos es de 4 semanas. Evitar el baño los dos días siguientes a la aplicación del producto. No manipular a los animales hasta que la zona de aplicación esté seca. Evitar el contacto con los ojos. No se han hecho estudios específicos en hembras gestantes o en lactación. Eliminar los residuos según normativas locales evitando los cursos de agua. Lavarse las manos después de su uso. Conservar a menos de 30 °C y en lugar seco. **Nº de registro** Effipro 50 mg solución spot-on para gatos 2017-ESP. Effipro 67 mg solución spot-on para perros pequeños 2021-ESP. Effipro 134 mg solución spot-on para perros medianos 2022-ESP. Effipro 268 mg solución spot-on para perros grandes 2023-ESP. Effipro 402 mg solución spot-on para perros muy grandes 2024-ESP.

EFFITIX

Antiparasitario externo en solución spot on



Composición

Fipronilo: 61 mg/ml. Permetrina: 545 mg/ml.

Indicaciones

Elimina y mata las pulgas (acción insecticida) y garrapatas (acción acaricida). Actividad repelente frente a la picadura del mosquito *Phlebotomus* transmisor de la leishmaniosis. Actividad repelente frente a la picadura de los mosquitos *Culex* y *Aedes*, transmisores de la filaria.

Propiedades

Una pipeta protege durante 4 semanas frente a los parásitos externos más importantes del perro: flebotomos, pulgas, garrapatas y mosquitos. Pipeta antigoteo de fácil apertura y aplicación precisa.

Posología y modo de empleo

Aplicar 1 pipeta de la presentación correspondiente según peso del animal. Una aplicación al mes. Para perros de más de 60 kg usar la combinación apropiada de pipetas. La dosis mínima es de 6,7 mg fipronilo/kg PV y 60 mg de permetrina/kg PV. En perros de menos de 20 kg aplicar en dos puntos. En perros de más de 20 kg aplicar en 2-4 puntos.

Presentaciones

Perros muy pequeños (entre 1,5 y 4 kg). Perros pequeños (entre 4 y 10 kg). Perros medianos (entre 10 y 20 kg). Perros grandes (entre 20 y 40 kg). Perros muy grandes (entre 40 y 60 kg). Disponible en cajas de 4 y 24 pipetas.

Contraindicaciones Hipersensibilidad a las sustancias activas o excipientes. No usar en gatos ni conejos. No usar en animales enfermos o convalecientes, perros de menos de 12 semanas o de 1,5 kg. **Reacciones adversas** Reacciones cutáneas en el lugar de administración (prurito, eritema) y prurito general. Hiperactividad. Vómitos. En caso de lamedura, hipersalivación transitoria. **Precauciones** Mantener alejado de los niños. Conservar < 30 °C en embalaje original. Baños frecuentes podrían afectar la eficacia. Tratar a todos los animales del hogar. Evitar contacto con ojos y boca y el lamido. Extremadamente tóxico para los gatos: mantener los perros tratados alejados hasta que se seque la zona y en caso de exposición accidental, lavar al gato y acudir al veterinario. **Precauciones para las personas** Puede causar neurotoxicidad e irritación de ojos, piel o mucosas por contacto y puede ser nocivo si se ingiere. En caso de exposición lave la zona y consulte con un médico. Lavar las manos después del uso. No comer, beber o fumar. Las personas con hipersensibilidad deben evitar el contacto. Tratar por la noche para minimizar el contacto durante 12 h. Puede afectar adversamente a los organismos acuáticos: los perros tratados no deben bañarse en cursos de agua durante los dos días siguientes. **Gestación y lactación** Evaluar beneficio riesgo. Uso veterinario. **Nº de registro** Effitix 26,8 mg/240 mg solución spot on para perros muy pequeños (1,5-4 kg) 3098 ESP. Effitix 67 mg/600 mg solución spot on para perros pequeños (4-10 kg) 3099 ESP. Effitix 134 mg/1.200 mg solución spot on para perros medianos (10-20 kg) 3100 ESP. Effitix 268 mg/2.400 mg solución spot on para perros grandes (20-40 kg) 3101 ESP. Effitix 402 mg/3.600 mg solución spot on para perros muy grandes (40-60 kg) 3102 ESP.



PREVENDER

Collar antiparasitario



Composición
Diazinón.

Indicaciones
Indicado para la prevención de pulgas y garrapatas.

Propiedades
7 meses de actividad. Adaptado al peso del perro.

Posología y modo de empleo
Un collar por animal. Colocar el collar alrededor del cuello dejando un par de dedos de holgura. Cortar el trozo sobrante.

Presentaciones
Perro y perro grande. Caja con un collar.



Contraindicaciones Animales enfermos o convalecientes, menores de 6 meses, hembras en lactación. **Observaciones** Su actividad permanece durante 7 meses. No administrar con inhibidores de la colinesterasa ni depresores del SNC. Pueden producirse reacciones de hipersensibilidad. Evitar que el animal muerda el collar. En caso de ingestión accidental administrar atropina y 2-PAM. Evitar el contacto repetido o prolongado con la piel, lavándose las manos después de la manipulación. Mantener lejos de los alimentos y de los niños. Conservar en la bolsa protectora y en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz. **Nº de registro** Prevender perro 1006-ESP.

PREVENDOG

Collar antiparasitario para perros



Composición

Deltametrina: 40 mg/g.

Indicaciones

Efecto repelente (anti-alimentación) frente a la picadura del *Phlebotomus perniciosus* trasmisor de la leishmaniosis y frente a la picadura del mosquito (*Culex pipiens*) trasmisor de la dirofilairia. Efecto acaricida frente a garrapatas (*Ixodes ricinus* y *Rhipicephalus sanguineus*).

Propiedades

Un collar protege durante 6 meses frente a garrapatas y mosquitos, y 5 meses frente a flebotomos. Matriz de color gris y sin fragancias, sistema anti estrangulamiento, tecnología avanzada de liberación continua.

Posología y modo de empleo

Un collar por animal. Colocar el collar alrededor del cuello dejando dos dedos entre el collar y el cuello del perro. Deslizar el extremo a través de la hebilla y cortar en diagonal el exceso de longitud a partir de los 5 cm.

Presentaciones

Collar de 35 cm: perros pequeños (hasta 5 kg) con un cuello de hasta 28 cm.

Collar de 60 cm: perros pequeños y medianos (0-25 kg) con un cuello de hasta 48 cm.

Collar de 75 cm: perros grandes y muy grandes (más de 25 kg) con un cuello de hasta 65 cm.

Cajas con 1 y 2 collares.



Contraindicaciones Cachorros de menos de 7 semanas de edad. Hipersensibilidad a la sustancia activa/ excipientes. No usar en gatos ni perros con lesiones en la piel. **Advertencias/precauciones** Aplicar 1 semana antes de la exposición. No ingerir. No permitir que los niños se lo pongan en la boca. Lavarse las manos después de su colocación. Evitar el contacto prolongado con el collar. En caso de exposición oral accidental o ingestión, solicitar asesoramiento médico. Aunque el contacto accidental con el agua no reduce la eficacia del collar, la deltametrina es tóxica para los peces y otros organismos acuáticos. No permitir que los perros con el collar se bañen en los cursos de agua. No usar durante la gestación. Puede utilizarse durante la lactancia. No usar con otros parasitocidas piretroides u organofosforados. En caso de ingesta accidental pueden aparecer síntomas de intoxicación: movimientos descoordinados, temblor, hipersalivación, vómitos, rigidez de los cuartos traseros que suelen disminuir dentro de 48 horas. Contactar con el veterinario. **Reacciones adversas** En raras ocasiones pueden aparecer reacciones locales de la piel (prurito, eritema, pérdida del pelo) en el cuello o en la piel en general. En casos muy raros alteraciones del comportamiento (por ejemplo, letargo o hiperactividad) a menudo asociado con la irritación de la piel, síntomas gastrointestinales (vómitos, diarrea e hipersalivación) y problemas neuromusculares (ataxia y temblor del músculo). Los síntomas disminuyen a las 48 horas de retirar el collar. **Titular** Vetpharma Animal Health. **Nº de registro** Prevendog 0,636 g 3730 ESP. Prevendog 1,304 g 3728 ESP. Prevendog 1,056 g 3729 ESP.

ENDOGARD SABOR COMPRIMIDOS

Tratamiento de infestaciones por nematodos y cestodos



Composición

Perros: Prazicuantel 50 mg, Pirantel embonato 144 mg y Febantel 150 mg por cp.

Perros grandes: Prazicuantel 175 mg, Pirantel embonato 504 mg, Febantel 525 mg por cp.

Indicaciones

Tratamiento en perros adultos y cachorros de infestaciones por ascáridos (*Toxocaracanis*, *Toxascaris leonina*-forma inmadura tardía y forma madura), anquilostomas (*Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*-adultos) y cestodos (*Taenia spp.*, *Dipylidiumcaninum*).

Posología y modo de empleo

Administrar vía oral, directamente o en la comida, 15 mg/kg de peso de febantel, 14,4 mg/kg de pirantel y 5 mg/kg prazicuantel: 1 comprimido (perro) por cada 10 kg de peso o 1 comprimido (perro grande) por cada 35 kg de peso. Desde las 2 semanas hasta las 12 semanas de edad, tratar cada 2 semanas. A partir de entonces, tratar con una dosis única cada 3 meses. En caso de infestación por un nematodo con alta carga parasitaria, repetir la dosis tras 14 días. Para el control de *Toxocara*, tratar a las perras 2 semanas después del parto y cada 2 semanas hasta el destete.

Presentaciones

Perros: caja de 100 cp (10 blísteres de 10 cp).

Perros grandes: caja de 60 cp (6 blísteres de 10 cp).



Contraindicaciones Piperazinas. Compuestos colinérgicos. Hipersensibilidad a las sustancias activas o excipientes. Perros menores de 2 semanas y/o de 2 kg. **Observaciones** En gestación consultar con un veterinario; no superar la dosis ni usar durante los dos primeros tercios. En raros casos puede aparecer defecación incontrolada, diarrea y/o vómitos. Desechar los comprimidos parcialmente usados. Después de administrarlo, lavarse las manos. En caso de ingestión accidental consulte con un médico. **Nº de registro** Endogard sabor comprimidos para perros 2330-ESP. Endogard comprimidos para perros grandes 2331-ESP.

Con prescripción veterinaria.

MILPRO

Antiparasitario interno en comprimidos



Composición

Milbemicina oxima y prazicuantel 12.5 mg/125 mg; 2.5 mg/25 mg; 16 mg/40 mg; 4 mg/10 mg.

Indicaciones

Tratamiento de infecciones mixtas por cestodos y nematodos adultos. Prevención de dirofilariosis si está indicado el tratamiento concomitante contra cestodos.

Posología y modo de empleo

Por kg: 0,5 mg de milbemicina oxima+5 mg de prazicuantel en perros y 2 mg de milbemicina oxima+5 mg de prazicuantel en gatos vía oral en una sola toma. Pesar para correcta dosificación. Administrar con o después de la comida. Para infecciones de *Angiostrongylus vasorum* se recomienda Milbemicina oxima 4 veces a intervalos semanales: si está indicado tratamiento concomitante frente a cestodos, administrar la primera semana y producto monovalente las 3 siguientes. Para prevenir la angiostrongilosis administrar cada 4 semanas.

Presentaciones

Perros pequeños y cachorros (24 comprimidos). Perros adultos (4 y 48 comprimidos). Gatos pequeños y gatitos (24 comprimidos). Gatos adultos (4 y 48 comprimidos).

Contraindicaciones Hipersensibilidad al producto. No usar Milpro para perros en menores de 5 kg ni Milpro para cachorros en menores de 2 semanas y/o de 0.5 kg. No usar Milpro para gatos en menores de 2 kg ni Milpro para gatitos en menores de 6 semanas de edad y/o 0.5 kg. **Observaciones** En muy raras ocasiones se pueden producir signos sistémicos como letargo, neurológicos (temblores, ataxia) y/o gastrointestinales. Considerar epidemiología y condiciones del animal mediante asesoramiento profesional. El uso frecuente y repetido puede causar resistencias. En perros Collie o razas relacionadas no sobrepasar la dosis y no usar en cachorros. En animales de riesgo se recomienda excluir la presencia de *Dirofilaria immitis*, en cuyo caso habría que tratar previamente con un adulticida para evitar reacciones de hipersensibilidad. En caso de equinocosis, seguir directrices específicas de tratamiento y seguimiento y de seguridad de las personas. En ausencia de estudios específicos, en animales debilitados o con funciones hepática o renal comprometidas y en gestantes, lactantes o reproductores, valorar beneficio/riesgo. En perros de menos de 4 semanas, es infrecuente una infección por cestodos y podría no ser necesario un producto combinado. Lavar las manos después del uso. En caso de ingestión accidental consulte con un médico. Aunque no ha mostrado interacción con selamectina, tener precaución al combinar con otras lactonas macrocíclicas. Eliminar conforme normativas. No verter en cursos de agua. **Nº de registro** Milpro 12,5 mg/125 mg comprimidos recubiertos para perros 3095 ESP. Milpro 2,5 mg/25 mg comprimidos recubiertos para perros pequeños y cachorros 3094 ESP. Milpro 16 mg/40 mg comprimidos recubiertos con película para gatos 3097. Milpro 4 mg/10 mg comprimidos recubiertos con película para gatos pequeños y gatitos 3096.

Con prescripción veterinaria.



MILTEFORAN 20 mg/ml

Control de la leishmaniosis en solución oral



Composición

Miltefosina 20 mg/ml.

Indicaciones

Control de la leishmaniosis canina.

Posología y modo de empleo

2 mg/kg de peso vivo vertidos sobre el alimento una vez al día durante 28 días por vía oral (1 ml de la solución oral por 10 kg de peso vivo al día).

Presentaciones

Frasco con 30, 60 o 90 ml.



Contraindicaciones Hipersensibilidad al producto. Gestación, lactancia y animales en reproducción. **Observaciones** Se pueden producir vómitos transitorios (el 16% de los perros tratados) y diarrea (el 12% de los perros tratados). Determinar con exactitud el peso del perro para evitar infradosificaciones. Manipular con guantes y gafas. No debe ser administrado por mujeres embarazadas. No permitir que los perros recién tratados laman a personas. **Nº de registro** Milteforan 20 mg/ml solución oral para perros 1761-ESP.

Con prescripción veterinaria.

VIRBAMINTHE

Antihelmíntico en pasta oral



Composición

Niclosamida 240 mg/ml. Oxibendazol 30 mg/ml.

Indicaciones

Infestaciones por áscaris, ancilostomos y cestodos.

Posología y modo de empleo

0,5 ml/kg p.v., en una sola toma, sobre la lengua del animal o mezclado con el alimento. Desparasitar al menos 3-4 veces al año. En cachorros y gatitos tratar dos veces con 4 semanas de intervalo, entre la 6ª y la 12ª semana. En reproductoras tratar 3 veces: en el apareamiento, 1 semana antes del parto y 3-4 semanas después del parto.

Presentaciones

Injectores con 10 y 25 ml.



Contraindicaciones Cachorros menores de 2 semanas y gatitos menores de 3 semanas. Diarreas y oclusiones intestinales. **Observaciones** Se pueden producir diarreas, náuseas y vómitos. Mantener en su embalaje de origen en lugar fresco. **Nº de registro** Virbaminthe 2394-ESP.

Con prescripción veterinaria.

EVICTO

Antiparasitario en spot-on con selamectina

Composición

Selamectina 15 mg / 30 mg / 45 mg / 60 mg / 120 mg / 240 mg.

Indicaciones

Perros y gatos: infestaciones por pulgas producidas por *Ctenocephalides spp* durante 1 mes (adulticida, ovicida y larvicida). Prevención de la filariosis producida por *Dirofilaria immitis*, mediante administración mensual. Seguro en animales infectados con el parásito adulto. Infestaciones por piojos (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*). Tratamiento de la acariosis de los oídos (*Otodectes cynotis*) y, en el perro, de la sarna sarcóptica (*Sarcoptes scabiei*). Tratamiento de ascáridos (*Toxocara cati*, *Toxocara canis*) en sus formas adultas y, en el gato, de anquilostomas (*Ancylostoma tubaeforme*) en sus formas adultas.

Posología

Una pipeta según el peso del animal. La dosis mínima es de 6 mg de selamectina/kg de p.v. Aplicar en un solo punto de la piel por delante de las escápulas. Los animales pueden bañarse 2 horas después del tratamiento.

Reacciones adversas En gatos, en raras ocasiones alopecia transitoria en el lugar de la aplicación y si, hay lamido intenso, puede aparecer hipersalivación. Muy raramente, irritación local transitoria y signos neurológicos reversibles. **Observaciones** No usar en perros y gatos < 6 semanas, ni en gatos enfermos o debilitados con bajo peso. Debe aplicarse únicamente sobre la piel. Para el tratamiento de la acariosis de los oídos, no aplicar directamente en el canal auditivo. Muy inflamable. Evitar el contacto con piel y ojos. En contacto accidental, lavar con agua y consultar al médico. Los animales tratados no deben manipularse ni permitir a los niños jugar con ellos hasta que estén secos. Conservar en lugar seco. **Nº de registro Evicto® 15 mg para gatos y perros < 2,5 kg** EU/2/19/242/002. **Evicto® 30 mg para perros entre 2,6 y 5 kg** EU/2/19/242/011. **Evicto® 45 mg para gatos entre 2,6 y 7,5 kg** EU/2/19/242/005. **Evicto® 60 mg para perros entre 5,1 y 10 kg** EU/2/19/242/014. **Evicto® 120 mg para perros entre 10,1 y 20 kg** EU/2/19/242/017. **Evicto® 240 mg para perros entre 20,1 y 40 kg** EU/2/19/242/020.

Con prescripción veterinaria.

Presentaciones

Evicto 15 mg para gatos y perros < 2,5 kg
Evicto 30 mg para perros entre 2,6 y 5 kg
Evicto 45 mg para gatos entre 2,6 y 7,5 kg
Evicto 60 mg para perros entre 5,1 y 10 kg
Evicto 120 mg para perros entre 10,1 y 20 kg
Evicto 240 mg para perros entre 20,1 y 40 kg

Disponible en cajas de 4 pipetas.



BIOLÓGICOS

Vacunas

- ☒ Canigen Cachorros 2b
- ☒ Parvigen
- ☒ Canigen MHL
- ☒ Canigen MHPL
- ☒ Canigen DHPPiL
- ☒ Canigen DHPPi
- ☒ Canigen L4
- ☒ Rabigen
- ☒ Feligen CRP
- ☒ Leucogen
- ☒ Leucofeligen FeLV/RCP

Otros biológicos

- ☒ Virbagen Omega



CANIGEN CACHORROS 2b

Parvovirus canina. Suspensión inyectable



Composición

Parvovirus canino vivo atenuado 2b (cepa CPV39), mínimo de $10^{5,6}$ a $10^{7,5}$ TCID₅₀.

Indicaciones

Inmunización activa frente a parvovirus canina en cachorros a partir de 5 semanas de edad.

Posología y modo de empleo

Una dosis/perro vía subcutánea. Administrar una segunda dosis dos semanas más tarde.

Presentación

Caja con 10 dosis.



Contraindicaciones Gestación y lactancia. **Observaciones** En el punto de inyección puede producirse de manera transitoria prurito, dolor leve o hinchazón. Se pueden observar reacciones de hipersensibilidad. Vacunar sólo animales sanos y desparasitados. Mantener a temperatura de refrigeración (2-8 °C). No congelar. Proteger de la luz. **Nº de registro** Canigen Cachorros 2B 1609-ESP.

Con prescripción veterinaria.

PARVIGEN

Parvovirus canina

Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable



Composición

Parvovirus canino vivo atenuado 10^5 - 10^7 DICC₅₀.

Indicaciones

Inmunización activa frente al parvovirus canino.

Posología y modo de empleo

Una dosis/perro vía subcutánea. Primovacunación: una primera dosis entre las 8 y 12 semanas de edad y la segunda 3 o 4 semanas más tarde. El protocolo de vacunación no deberá finalizar en ningún caso antes de la semana 12-13. Revacunación: anual.

Presentación

Caja con 10 dosis.

Reacciones adversas En muy raras ocasiones se puede producir hinchazón leve y transitoria, dolor y prurito que se resuelven sin tratamiento. También se pueden producir diarreas transitorias, hipertermia o debilidad, así como reacciones de hipersensibilidad. En caso de reacción alérgica o anafiláctica, debe administrarse tratamiento sintomático apropiado.

Observaciones En perros en entornos de alto riesgo administrar una primera dosis a partir de las 6 semanas de vida seguida de dos dosis cada tres semanas. Vacunar sólo animales sanos y desparasitados. Mantener a temperatura de refrigeración (2-8 °C). **Nº de registro** Parvigen 3238 ESP.

Con prescripción veterinaria.



CANIGEN MHL

Hepatitis, moquillo y leptospirosis canina
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable



Composición

Liofilizado: Adenovirus canino tipo 2 vivo atenuado 10^4 - 10^6 DICC₅₀. Virus del moquillo canino vivo atenuado 10^3 - 10^5 DICC₅₀.

Fracción líquida: *Leptospira canicola* inactivada y *Leptospira icterohaemorrhagiae* inactivada >80% de protección.

Indicaciones

Inmunización activa frente al virus del moquillo canino, adenovirus canino tipo 2, y leptospirosis caninas causadas por las serovariedades de *Leptospira interrogans*, *canicola* e *icterohaemorrhagiae*.

Posología y modo de empleo

Una dosis/perro vía subcutánea. Primovacunación: dos dosis, la primera entre las 8 y 12 semanas de edad y la segunda 3 o 4 semanas más tarde. El protocolo de vacunación no deberá finalizar en ningún caso antes de la semana 12-13. Revacunación: anual.

Presentación

Caja con 10 dosis.

Reacciones adversas En muy raras ocasiones se pueden producir hinchazón leve y transitorio, dolor y prurito que se resuelven sin tratamiento. También se pueden producir diarrea transitoria, hipertermia o debilidad, así como reacciones de hipersensibilidad. En caso de reacción alérgica o anafiláctica, debe administrarse tratamiento sintomático apropiado. **Observaciones** En perros en entorno de alto riesgo administrar una primera dosis a las 8 semanas de vida seguida de dos dosis cada tres semanas. Mantener a temperatura de refrigeración (2-8 °C). **Nº de registro** Canigen MH₂ L 3185 ESP.

Con prescripción veterinaria.



CANIGEN MHPL

Hepatitis, moquillo, parvovirus y leptospirosis canina
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable



Composición por dosis

Liofilizado: Adenovirus canino tipo 2 vivo atenuado 10^4 - 10^6 DICC₅₀. Virus del moquillo canino vivo atenuado 10^3 - 10^5 DICC₅₀. Parvovirus canino vivo atenuado 10^5 - 10^7 DICT₅₀.

Fracción líquida: *Leptospira canicola* inactivada y *Leptospira icterohaemorrhagiae* inactivada >80% de protección.

Indicaciones

Inmunización activa frente al virus del moquillo canino, adenovirus canino tipo 2, parvovirus canino y leptospirosis caninas causadas por las serovariedades de *Leptospira interrogans*, *canicola* e *icterohaemorrhagiae*.

Posología y modo de empleo

Una dosis/perro vía subcutánea. Primovacunación: administrar dos dosis, la primera entre las 8 y 12 semanas de vida y la segunda 3 a 4 semanas más tarde. El protocolo de vacunación no deberá finalizar en ningún caso antes de la semana 12-13.

Revacunación: anual.

Presentación

Caja con 10 dosis.

Reacciones adversas En muy raras ocasiones se puede producir hinchazón leve y transitorio, dolor y prurito que se resuelven sin tratamiento. También se pueden producir diarrea transitoria, hipertermia o debilidad, así como reacciones de hipersensibilidad. En caso de reacción alérgica o anafiláctica, debe administrarse tratamiento sintomático apropiado. **Observaciones** En perros en entorno de alto riesgo administrar una primera dosis a las 8 semanas de vida seguida de dos dosis cada tres semanas. Vacunar sólo animales sanos y desparasitados. Mantener a temperatura de refrigeración (2-8 °C). **Nº de registro** Canigen MH_{A2} PL 3220 ESP.

Con prescripción veterinaria.



CANIGEN DHPPiL

Hepatitis, parainfluenza, moquillo, parvovirus y leptospirosis canina
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable



Composición

Liofilizado: Virus del moquillo canino vivo atenuado 10^3 - 10^5 DICC₅₀. Adenovirus canino tipo 2 vivo atenuado 10^4 - 10^6 DICC₅₀. Parvovirus canino vivo atenuado 10^5 - 10^7 DICC₅₀. Virus parainfluenza vivo atenuado 10^5 - 10^7 DICC₅₀.

Suspensión: *Leptospira canicola* inactivada y *Leptospira icterohaemorrhagiae* inactivada >80% de protección.

Indicaciones

Inmunización activa frente al virus del moquillo, adenovirus tipo 2, parvovirus, virus de la parainfluenza canina y leptospirosis caninas causadas por *Leptospira interrogans*, serovariedades *canicola* e *icterohaemorrhagiae*.

Posología y modo de empleo

Una dosis/perro vía subcutánea. Primovacunación: dos dosis, la primera entre las 8 a 12 semanas y la segunda 3-4 semanas más tarde. Los anticuerpos maternos pueden en algunos casos influir en la respuesta inmunitaria, en estos casos administrar una tercera dosis a las 15 semanas. Revacunación anual y después a intervalos de hasta 3 años (anual para Pi y L).

Presentación

Caja con 10 dosis.

Observaciones Frecuentemente pueden observarse reacciones locales transitorias. Son comunes estados letárgicos post-vacunales. En raros casos hipertermia, alteraciones digestivas y en muy raros casos reacciones de hipersensibilidad en que se deberá administrar tratamiento sintomático apropiado. No utilizar durante la gestación y lactancia. Vacunar solo animales sanos y convenientemente desparasitados. Mantener a temperatura de refrigeración (2-8 °C). No congelar. **Nº de registro** 3426 ESP.

Con prescripción veterinaria.



CANIGEN DHPPi

Hepatitis, parainfluenza, moquillo y parvovirus canina
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable



Composición

Liofilizado: Virus del moquillo canino 10^3 - 10^5 DICC₅₀. Adenovirus canino tipo 2 10^4 - 10^6 DICC₅₀. Parvovirus canino 10^5 - 10^7 DICC₅₀. Virus parainfluenza 10^5 - 10^7 DICC₅₀.

Solvente: Agua para inyección, 1 ml.

Indicaciones

Inmunización activa contra moquillo, hepatitis, laringotraqueitis infecciosa, parvovirus y parainfluenza a partir de las 8 semanas de edad.

Posología y modo de empleo

Una dosis/perro vía subcutánea. Primovacunación: dos dosis, la primera a partir de las 8 semanas de edad y la segunda 3 o 4 semanas más tarde. Revacunación anual.

Presentación

Caja con 10 dosis.

Reacciones adversas Frecuentes: reacción local moderada como hinchazón (≤ 4 cm) o edema local difuso leve, en raros casos asociado con dolor o prurito, que se resuelve espontáneamente en 1 o 2 semanas. Son comunes algunos estados letárgicos transitorios. En raros casos hipertermia o alteraciones digestivas tales como anorexia, diarrea o vómitos. En muy raros casos reacciones de hipersensibilidad. En caso de reacciones alérgicas o anafilácticas, debería administrarse tratamiento sintomático apropiado.

Observaciones y advertencias La presencia de anticuerpos maternos puede interferir con la vacunación. En caso de autoinyección accidental consulte con un médico. No utilizar durante la gestación y la lactancia. No existe información disponible sobre la seguridad y la eficacia del uso de esta vacuna con cualquier otro medicamento veterinario. Vacunar sólo animales sanos. Conservar y transportar refrigerado (entre 2 °C y 8 °C). Proteger de la luz. No congelar. **Nº de registro** 3460 ESP.

Con prescripción veterinaria.



CANIGEN L4

Leptospira interrogans serogrupos *Canicola*, *Icterohaemorrhagiae* y *Australis* y *L. kirschneri* serogrupo *Grippityphosa*. Suspensión inyectable



Composición

L. interrogans serogrupo *Canicola* serovariedad *Portland-vere* (cepa Ca-12-000) 3550-7100 U.¹ *L. interrogans* serogrupo *Icterohaemorrhagiae* serovariedad *Copenhageni* (cepa Ic-02-001) 290-1000 U.¹ *L. interrogans* serogrupo *Australis* serovariedad *Bratislava* (cepa As-05-073) 500-1700 U.¹ *L. kirschneri* serogrupo *Grippityphosa* serovariedad *Dadas* (cepa Gr-01-005) 650-1300 U.¹

Indicaciones

Inmunización activa frente a leptospira para reducir la infección y excreción urinaria. Establecimiento de la inmunidad en 3 semanas. Duración de la inmunidad: 1 año.

Posología y modo de empleo

Administrar dos dosis vía subcutánea a temperatura ambiente con un intervalo de 4 semanas a partir de las 6 semanas de edad. La primera dosis entre las 6 y 9 semanas de edad y la segunda entre las 10 y las 13. En caso de nivel alto de ADM se recomienda la primera vacunación a las 9 semanas de edad. Revacunación anual.

Para uso simultáneo con vacunas Canigen Una dosis de Canigen de moquillo canino, adenovirus canino tipo 2, parvovirus canino y/o parainfluenza canina, debe ser reconstituída con 1 dosis de Canigen L4.

Presentación

Caja con 10 dosis (1 ml).

¹Unidades ELISA de masa antigénica

Reacciones adversas Muy frecuentemente: aumento leve y pasajero de la t° ($\leq 1^{\circ}\text{C}$) con actividad y/o apetito reducido; pequeña inflamación transitoria en el punto de inyección (≤ 4 cm), que puede ser firme y dolorosa. En muy raras ocasiones: anemia hemolítica, trombocitopenia o poliartritis inmuno-mediadas; hipersensibilidad aguda, que puede evolucionar a anafilaxis con riesgo de muerte. A dosis doble las reacciones adversas pueden ser más graves y/o durar más tiempo. **Observaciones** Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar la autoinyección accidental o el contacto con los ojos. En caso de irritación ocular, consulte con un médico. Puede utilizarse durante la gestación. Eliminar los residuos según las normativas locales. Vacunar únicamente animales sanos. Conservar entre 2°C y 8°C . No congelar. Proteger de la luz. Validez después de abierto: 10 h. Validez después de la reconstitución con vacunas Canigen: 45 min.

Nº de registro Canigen L4 EU/2/15/183/003.

Con prescripción veterinaria.





RABIGEN

Rabia (perros y gatos). Suspensión inyectable

Composición

Virus rabia, VP-12, inactivado y adyuvantado, mín. ≥ 1 UI.

Indicaciones

Inmunización activa frente al virus de la rabia.

Posología y modo de empleo

Una dosis/animal vía subcutánea. Primovacunación: una dosis/animal a partir de las 12 semanas de edad. Revacunación: anual.

Presentación

Caja con 10 dosis.



Reacciones adversas En muy raras ocasiones se pueden producir, nódulos o hinchazón leve y transitorio, dolor y prurito que se resuelven sin tratamiento. También se pueden presentar en muy raras ocasiones diarrea transitoria, hipertermia o debilidad, así como reacciones de hipersensibilidad. En caso de reacción alérgica o anafiláctica debe administrarse tratamiento sintomático apropiado. **Observaciones** Vacunar sólo animales sanos y desparasitados. Mantener a temperatura de refrigeración (2-8 °C). **Nº de registro** Rabigen 3205 ESP.

Con prescripción veterinaria.

FELIGEN CRP

Calicivirosis, panleucopenia y rinotraqueitis felina
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable



Composición

Virus de la calicivirosis vivo atenuado (cepa F-9) $10^{4,6}$ - $10^{6,1}$ DICC₅₀. Virus de la panleucopenia vivo atenuado $10^{3,7}$ - $10^{4,5}$ DICC₅₀. Virus de la rinotraqueitis vivo atenuado, (cepa F2) 10^5 - $10^{6,6}$ DICC₅₀.

Indicaciones

Inmunización activa frente a la panleucopenia felina, el calicivirus felino y el virus de la rinotraqueitis infecciosa felina.

Posología y modo de empleo

Una dosis/gato vía subcutánea.

Primovacunación: una dosis a partir de las 8 semanas de vida del animal y una segunda dosis 3 o 4 semanas después.

Revacunación: anual.

Presentación

Caja con 10 dosis.



Reacciones adversas Muy frecuentemente alteraciones digestivas postvacunales transitorias. Frecuentemente edemas leves y transitorios, ligera hipertermia y letargia que se resolvieron espontáneamente. En muy raras ocasiones reacciones de hipersensibilidad (p.e emesis, diarrea, disnea, edema alérgico). En caso de reacción alérgica o anafiláctica administrar un tratamiento sintomático apropiado. Después de la administración de cualquier vacuna que contenga el componente de calicivirus felino, en muy raras ocasiones puede aparecer el síndrome de cojera febril en gatitos. **Observaciones** Vacunar sólo animales sanos y desparasitados. Conservar a temperatura comprendida entre 2-8 °C. **Nº de registro** Feligen CRP 3265 ESP.

Con prescripción veterinaria.



LEUCOGEN

Leucemia felina. Suspensión inyectable

Composición

Molécula recombinante del virus de la leucemia felina (P45) 102 µg.

Indicaciones

Inmunización activa frente al virus de la leucemia felina.

Posología y modo de empleo

Una dosis/gato vía subcutánea.

Primovacuna: dos inoculaciones, la primera a partir de la octava semana de vida y la segunda de 3 a 4 semanas más tarde.

Los anticuerpos maternos pueden influenciar negativamente en la respuesta. Si se sospecha la presencia de anticuerpos maternos, puede ser conveniente una tercera dosis a partir de las 15 semanas. Revacunación: primera revacunación un año después. Las siguientes pueden administrarse a intervalos de 3 años.

Presentación

Caja con 10 dosis.



Contraindicaciones Gatas gestantes o en lactación. **Reacciones adversas** Reacción local transitoria y moderada (≤ 2 cm): hinchazón, edema o un nódulo que se resuelve espontáneamente en 3-4 semanas como máximo. En raras ocasiones, dolor a la palpación, estornudos o conjuntivitis, que se resuelven espontáneamente. Hipertermia (duración de 1 a 4 días), apatía, alteraciones digestivas. En muy raras ocasiones, reacciones anafilácticas. En caso de shock anafiláctico, se deberá administrar tratamiento sintomático apropiado. **Observaciones** Mantener a temperatura de refrigeración (2-8 °C). No congelar. Vacunar solo animales sanos y desparasitados. Vacunar solo gatos negativos al FeLV. **Nº de registro** Leucogen EU/2/09/096/001.

Con prescripción veterinaria.

LEUCOFELIGEN FeLV/RCP

Calicivirosis, panleucopenia, rinotraqueitis y leucemia felina
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable



Composición

Liofilizado: Calicivirus felino vivo atenuado (cepa F9) $10^{4,6}$ - $10^{6,1}$ DICC₅₀. Virus vivo atenuado de la rinotraqueitis felina (cepa F2) $10^{5,0}$ - $10^{6,6}$ DICC₅₀. Virus vivo atenuado de la panleucopenia felina (cepa LR 72) $10^{3,7}$ - $10^{4,5}$ DICC₅₀. Disolvente: antígeno p45 de la envuelta del FeLV purificado mínimo 102 µg.

Indicaciones

Inmunización activa frente a calicivirosis, rinotraqueitis viral, panleucopenia y leucemia felina.

Posología y modo de empleo

Una dosis/animal por vía subcutánea. Primovacuna: primera dosis a partir de las 8 semanas de edad y segunda 3 ó 4 semanas más tarde. Los anticuerpos maternos pueden influenciar negativamente la respuesta. Si se sospecha la presencia de anticuerpos maternos, puede ser conveniente una tercera dosis a partir de las 15 semanas. Revacunación: primera revacunación un año después. Las siguientes pueden administrarse a intervalos de 3 años para la leucemia, en cuyo caso, como se requiere revacunación anual para el resto de componentes, se puede administrar una dosis anual de Feligen CRP.

Presentación

Caja con 10 dosis.

Contraindicaciones Gatas gestantes o en lactación. **Reacciones adversas** Reacción local transitoria y moderada (≤ 2 cm): hinchazón, edema o un nódulo que se resuelve espontáneamente en 3-4 semanas como máximo. En raras ocasiones, dolor a la palpación, estornudos o conjuntivitis, que se resuelven espontáneamente. Hipertermia (1 a 4 días), apatía, alteraciones digestivas. En muy raras ocasiones reacciones anafilácticas. En caso de shock anafiláctico, se deberá administrar tratamiento sintomático apropiado. En muy raras ocasiones, reacciones febriles del síndrome de cojera en gatitos.

Precauciones Vacunar solo animales sanos y desparasitados. Vacunar solo los gatos negativos al FeLV. Conservar y transportar refrigerado (2-8 °C). **Nº de registro** Leucofeligen FeLV/RCP EU/2/09/097/001.

Con prescripción veterinaria.



VIRBAGEN OMEGA

Interferón Omega de origen felino
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable



Composición

Interferón omega recombinante de origen felino 10 MU/vial.

Indicaciones

Reducción de la mortalidad y signos de la parvovirus canina. Reducción de los signos clínicos y la mortalidad en las infecciones por FeLV y FIV durante una fase clínica no terminal.

Posología y modo de empleo

Perros: 2,5 MU/kg p.v./día por vía intravenosa durante 3 días.

Gatos: 1 MU/kg p.v./día por vía subcutánea durante 5 días. Administrar tres tratamientos de 5 días, los días 0, 14 y 60.

Presentaciones

Caja con 5 viales de fracción liofilizada y 5 viales con 1 ml de disolvente.

Caja con 1 vial de fracción liofilizada y 1 vial con 1 ml de disolvente.



Observaciones Utilizar en perros mayores de 1 mes de edad y en gatos mayores de 9 semanas. Puede producir de forma transitoria hipertermia, vómitos y ligera disminución de leucocitos, plaquetas y eritrocitos y aumento de aminotransferasa alanina. En gatos también puede producirse ligera diarrea y cansancio transitorio durante el tratamiento. No se ha establecido la seguridad durante la gestación y la lactancia. No mezclar con otros productos inmunológicos. En caso de autoinyección accidental consulte a su médico. Conservar a 4 ± 2 °C.

Nº de registro Virbagen Omega 10 MU para perros y gatos EU/2/01/030/002 y 004.

Con prescripción veterinaria.

DERMATOLÓGICOS

Alergias

- ☒ Allermyl
- ☒ Allercalm
- ☒ Allerderm spot-on
- ☒ Cortavance
- ☒ Cyclavance

Desorden queratoseborreico

- ☒ Sebomild

Infecciones cutáneas

- ☒ Clearium

Otitis

- ☒ Epi-otic
- ☒ Easotic

ALLERMYL

Champú para pieles sensibles o con picor. Suaviza e hidrata



Composición

Agua, agentes limpiadores suaves. Complejo lipídico cutáneo (ceramida 3, ceramida 6 II, ceramida 1), Glicotecnología (ramnosa, galactosa, manosa y lauril glucósido), Defensin technology (extracto de hojas de *Peumus boldus* y de *Spiraea ulmaria*), piroctona olamina, vitamina F, ácido linoleico y ácido linolénico.

Indicaciones

Diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de perros y gatos con desequilibrios en la barrera cutánea.

Propiedades

Ayuda a mantener la protección de la barrera cutánea frente a agresiones medioambientales. Efecto calmante e hidratante (Complejo lipídico cutáneo). Ayuda a mantener la salud de la piel con tecnología S-I-S (Skin Innovative Science technology). Efecto antiadhesivo de microorganismos (Glicotecnología). Defensa microbiana natural de la piel (Defensin technology).

Posología y modo de empleo

Mojar el pelo con agua tibia y aplicar. Frotar suavemente y aclarar. Repetir y dejar actuar durante 5-10 min. Aclarar con agua limpia abundante. Utilizar semanalmente o según consejo veterinario.

Presentación

Envase con 200 ml.

Observaciones Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. Contiene otros ingredientes peligrosos como la betaína de coco (EC 266-368-1). Evitar el contacto con los ojos. Si está en los ojos enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitarse las lentes de contacto si las hay y si es fácil de hacer. Continuar enjuagando. Inmediatamente llamar al centro de toxicología o al médico. **Nº de registro** Allermyl champú 111-H.





ALLERCALM

Champú para pieles sensibles y secas. Suaviza e hidrata

Composición

Agua, agentes limpiadores suaves, harina de avena coloidal, Glicotecnología (ramnosa, galactosa, manosa y lauril glucosido) y Defensin technology (extracto de hojas de *Peumus boldus* y de *Spiraea ulmaria*).

Indicaciones

Champú de avena, suave, natural y libre de detergentes. Formulado para la higiene regular en perros, gatos, cachorros y gatitos con pieles delicadas y sensibles y/o con prurito (picor).

Propiedades

Ayuda a mantener la belleza del pelaje proporcionando un pelo brillante, con agradable olor y libre de enredos. Ayuda a mantener la salud de la piel con la tecnología S-I-S (Skin Innovative Science technology). Efecto antiadhesivo de microorganismos (Glicotecnología). Ayuda a mantener el equilibrio natural microbiano de la piel (Defensin technology).

Posología y modo de empleo

Mojar el pelo con agua tibia y aplicar Allercalm. Frotar suavemente todo el cuerpo y aclarar. Repetir la operación y dejar actuar durante 5-10 minutos, aclarar con agua limpia abundante. Utilizar semanalmente o según consejo veterinario.

Presentación

Envase con 250 ml.



Advertencias Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. Evitar el contacto con los ojos. Nº de registro Allercalm 9438.

ALLERDERM SPOT-ON

Reparador dérmico de fácil aplicación



Composición

Complejo Lipídico Cutáneo (ceramidas 3, ceramidas 6 II, ceramidas 1 y ácidos grasos), Glicotecnología (ramnosa, galactosa y manosa), Defensin technology (extracto de hojas de *Peumus boldus* y de *Spiraea ulmaria*).

Indicaciones

Especialmente indicado para animales con problemas de piel, como complemento al tratamiento de dermatosis.

Propiedades

En animales sanos mejora la calidad de la piel y el pelo. En enfermedades dermatológicas complementa el tratamiento y ayuda a restablecer la barrera protectora de la piel facilitando la hidratación, reduciendo la sensibilidad y reforzando su función protectora. Incorpora la revolucionaria SIS technology™ (estimula las defensas naturales de la piel; acción calmante del picor y la irritación).

Posología y modo de empleo

Dosis inicial: 1 pipeta a la semana durante 4 semanas. La dosis puede aumentarse según gravedad. Aplicar 1 pipeta al mes como tratamiento de mantenimiento.

Abrir la pipeta, apartar el pelo de la zona entre las escápolas (en perros) o en el cuello (en gatos) y colocar la punta sobre la piel. Presionar suavemente hasta vaciar el contenido.

Presentaciones

Pipeta de 2 ml para perros de menos de 10 kg y gatos.
Pipetas de 4 ml para perros de 10 o más kg. Envase con 6 pipetas.

Observaciones En perros, aplicar a lo largo de la espalda. Puede aplicarse sobre piel lesionada. Se recomienda aplicar después del baño con el pelo seco. Evitar el almacenamiento a >25 °C. N° de registro Allerderm Spot-On 1880-H.



CORTAVANCE

Dermosteroide en spray



Composición

Hidrocortisona aceponato 0,584 mg/ml.

Indicaciones

Tratamiento sintomático de dermatosis inflamatorias y pruríticas. La hidrocortisona aceponato se metaboliza en la piel y llega al flujo sanguíneo en cantidades mínimas, lo que aumenta el efecto antiinflamatorio local y minimiza los efectos sistémicos indeseables.

Posología y modo de empleo

Pulverizar a una distancia de unos 10 cm de la zona tratada 1,52 µg de hidrocortisona aceponato/cm² de piel afectada al día (= dos pulsaciones en un cuadrado de 10 cm × 10 cm) diariamente durante 7 días. No requiere masaje.

Presentación

Frasco con 76 ml.



Contraindicaciones Úlceras cutáneas. **Observaciones** En el caso de enfermedad microbiana o infestación parasitaria, administrar el tratamiento apropiado. El uso en animales menores de 7 meses, gestantes o en lactación debe basarse en la evaluación del riesgo-beneficio. La superficie corporal total tratada no debe exceder de un área correspondiente a 1/3 de la superficie corporal. **Nº de registro** Cortavance 0,584 mg/ml solución para pulverización cutánea para perros EU/2/06/069/001.

Con prescripción veterinaria.

CYCLAVANCE

Ciclosporina en solución líquida



Composición

Ciclosporina 100 mg/ml.

Indicaciones

Perros: tratamiento de manifestaciones clínicas de dermatitis atópica.

Gatos: tratamiento sintomático de la dermatosis alérgica crónica.

Posología y modo de empleo

Administrar diariamente de forma inicial hasta obtener mejoría clínica satisfactoria (4-8 semanas) para posteriormente ajustar la frecuencia. Si no hay mejoría en 8 semanas, parar el tratamiento.

Perros: 5 mg/kg de p.v. (0,05 ml de solución oral por kg de p.v.) 2 horas antes o después de las comidas.

Gatos: 7 mg/kg de p.v. (0,07 ml de solución oral por kg de p.v.).

Presentaciones

Frasco de 5, 15, 30 y 50 ml con tapón dispensador y jeringa graduada.



Contraindicaciones Hipersensibilidad al producto. Desórdenes malignos. Diabetes. Lactantes. **Interacciones** Compuestos del grupo de azoles (p.e. el ketoconazol) y macrólidos como eritromicina aumentan la concentración de ciclosporina en sangre. Determinados inductores del citocromo P450, antiepilépticos y antibióticos (p.e. trimetoprim /sulfadimidina) pueden reducir la concentración plasmática. La ciclosporina es un sustrato y un inhibidor del transportador de P-glucoproteína MDR1: la administración simultánea con lactonas macrocíclicas (p.e. la ivermectina y la milbemicina) podría causar toxicidad del SNC. Puede incrementar la nefrotoxicidad de los antibióticos aminoglucósidos y del trimetoprim. No combinar con inmunosupresores. No vacunar durante el tratamiento ni 2 semanas antes o después. **Observaciones** Realizar un examen completo antes del tratamiento. Descartar y/o eliminar las infecciones previas. Tratar las pulgas. La ciclosporina reduce la respuesta antitumoral y afecta a los niveles de insulina. En animales de laboratorio a dosis altas es embriotóxica y fetotóxica: en reproductores y gestantes valorar riesgo/beneficio. Con enfermedad renal, monitorizar creatinina. No combinar con inmunosupresores. Lavarse las manos tras el uso. Evitar el contacto en caso de hipersensibilidad. En caso de contacto, lave la zona con agua. En caso de ingestión, consulte al médico. **Reacciones adversas** Muy frecuentemente: vómitos, heces, mucosas, blandas y diarrea. Leves y transitorias. Incremento del apetito. Infrecuentemente: Letargo o hiperactividad, anorexia, hipersalivación, hiperplasia gingival de leve a moderada, reacciones en la piel, lesiones verruciformes, cambios en el pelaje, enrojecimiento o hinchazón del pabellón de la oreja, debilidad o calambres musculares, polidipsia, linfopenia. Salivación moderada transitoria. En muy raros casos diabetes mellitus, especialmente en West Highland White Terrier. Los efectos secundarios pueden ser severos en animales individuales. **Nº de registro** Cyclavance 100 mg/ml solución oral 3011 ESP.

Con prescripción veterinaria.

SEBOMILD

Champú para pieles con grasa, con descamación o con mal olor.
Limpia y purifica



Composición

Agua, agentes limpiadores suaves, Glicotecnología (ramnosa, galactosa, manosa y lauril glucósido), Defensin technology (extracto de hojas de *Peumus boldus* y de *Spiraea ulmaria*), vitamina B6, salicilato sódico, ácido linoleico, ácido linolénico, piroctona olamina, gluconato de zinc y aceite de árbol de té.

Indicaciones

Indicado para perros y gatos con piel grasa y/o caspa. Elimina la grasa y la descamación dejando el pelo limpio y suave.

Propiedades

Ayuda a mantener el equilibrio fisiológico de la piel y el pelo. Elimina el exceso de sebo y la descamación. Neutraliza los malos olores. Ayuda a mantener la salud de la piel con tecnología S-I-S (Skin Innovative Science technology). Efecto antiadhesivo de microorganismos (Glicotecnología). Defensa microbiana natural de la piel (Defensin technology).


Posología y modo de empleo

Mojar el pelo con agua tibia y aplicar. Frotar suavemente y aclarar. Repetir y dejar actuar durante 5-10 min. Aclarar con agua limpia abundante. Utilizar semanalmente o según consejo veterinario.

Presentación

Envase con 200 ml.

Observaciones Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. Evitar el contacto con los ojos. **Nº de registro** Sebomild champú 191-H.



CLEARIUM 31,2 mg/ml

Champú con clorhexidina al 3%



Composición

Solución de clorhexidina digluconato 31,2 mg (correspondiente a 17,5 mg de clorhexidina).

Indicaciones

Tratamiento de la proliferación superficial de *Malassezia pachydermatis* y control de signos clínicos asociados.

Posología y modo de empleo

Aplicar un volumen según el peso del animal y la longitud del pelo. Mojar el pelo con agua tibia y aplicar en varios puntos. Masajear para formar espuma y aclarar. Repetir y dejar actuar durante 10 minutos. Aclarar con agua limpia abundante. Utilizar semanalmente o según consejo veterinario.

Presentación

Envase con 200 ml.

Contraindicaciones No usar en caso de hipersensibilidad de la sustancia activa o a algún excipiente. **Observaciones** Frecuentemente reacciones de prurito y eritematosas después del lavado. Inflamación conjuntival. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental, aclare con abundante agua y consulte con un médico. En caso de ingestión accidental, consultar con un médico. Evitar manipular a los animales inmediatamente después del tratamiento. Su uso debe basarse en la identificación de las infecciones y el control de sensibilidad según normativas antimicrobianas. En gestación y lactancia, evaluar beneficio/riesgo. No usar en menores de 5 meses ni durante más de 6 semanas. Uso externo, aplicar únicamente sobre la piel. Una vez abierto, usar antes de 2 meses. No refrigerar ni conservar por debajo de los 8 °C. **Nº de registro** Clearium 31,2 mg/ml 3746 ESP.

Con prescripción veterinaria.



EPI-OTIC

Limpia, calma y combate el mal olor de oídos



Composición

Agua, EDTA disódico, PCMX, dietilhexil sodio sulfosuccinato, ácido salicílico, Glicotecnología (ramnosa, galactosa, manosa) y Defensin technology (extracto de hojas de *Peumus boldus* y de *Spiraea ulmaria*).

Indicaciones

Con pH neutro de óptima tolerancia, limpia eficazmente los oídos de perros, gatos, cachorros o gatitos. Complemento indispensable en el tratamiento de las otitis. Su uso regular ayuda a prevenir las recaídas en animales predispuestos.

Propiedades

Limpia y purifica el conducto auditivo. Elimina los detritus celulares y el exceso de cerumen. Neutraliza los malos olores. Ayuda a mantener las condiciones del canal auditivo con S-I-S (Skin Innovative Science technology). Efecto antiadhesivo de microorganismos (Glicotecnología). Ayuda a mantener el equilibrio microbiano natural de la piel (Defensin technology).

Posología y modo de empleo

Girar el tapón blanco y aplicar en el conducto auditivo. Masajear la base de la oreja y retirar el producto sobrante del pabellón auricular con un algodón (no utilizar bastoncillos de algodón). No usar en caso de rotura de tímpano.

Presentación

Envase con 125 ml.



Observaciones Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. Evitar el contacto con los ojos. N° de registro Epi-Otic 9449.

EASOTIC

Suspensión ótica antiinflamatoria y antimicrobiana



Composición

Hidrocortisona aceponato 1,11 mg/ml. Miconazol nitrato 15,1 mg/ml. Gentamicina sulfato 1505 IU/ml.

Indicaciones

Otitis externa asociada con gérmenes sensibles a gentamicina o miconazol.

Posología y modo de empleo

Una aplicación al día en el oído afectado durante 5 días consecutivos. Antes de la primera administración, agitar el frasco y cebar la bomba.

Presentación

Envase para 10 aplicaciones.

Contraindicaciones Hipersensibilidad a alguno de los ingredientes. Perforación de tímpano. Demodicosis generalizada. No utilizar con sustancias ototóxicas. **Observaciones** Se puede producir rojez de tenue a moderada en la oreja (2,4%) y raramente pápulas (< 1%). Manténgase fuera del alcance de los niños. La otitis bacteriana y fúngica es a menudo de naturaleza secundaria y se debe hacer un diagnóstico para determinar los factores primarios. No se ha establecido la seguridad durante la gestación y la lactancia. **Nº de registro** Easotic gotas óticas en suspensión para perros EU/2/08/085/001.

Con prescripción veterinaria.



FARMACOLÓGICOS

Analgesia

- ☑ Carprox
- ☑ Inflacam comprimidos
- ☑ Inflacam inyectable
- ☑ Tramvetol comprimidos
- ☑ Tramvetol inyectable

Anestésicos y sedantes

- ☑ Medetor
- ☑ Revertor
- ☑ Vetflurane
- ☑ Zoletil

Antibióticos

- ☑ Enrox Sabor
- ☑ Rilexine comp. masticables

Antieméticos

- ☑ Vetemex

Oftalmología

- ☑ Soligental

Oncología

- ☑ Stelfonta

Reproducción

- ☑ Alizin
- ☑ Contralac
- ☑ Suprelorin
- ☑ Ypozane

CARPROX

Antiinflamatorio



Composición

Carprofeno 20 mg, 50 mg o 100 mg por comprimido.

Indicaciones

Reducción de la inflamación y el dolor en trastornos musculo-esqueléticos y enfermedad articular degenerativa. Control del dolor post-operatorio.

Posología y modo de empleo

Vía oral. 2-4 mg de carprofeno/kg p.v./día repartidas en una o 2 tomas. A los 7 días, reducir según respuesta clínica a 2 mg /kg/día en toma única.

Analgésica post-operatoria: 4 mg/kg/día durante 5 días o en función de la respuesta.

Presentaciones

Cajas con 100 comprimidos.



Contraindicaciones Gatos. Gestantes. Lactantes. Cachorros menores de 4 meses. Hipersensibilidad al producto. Enfermedades cardíacas, hepáticas o renales. Úlcera o hemorragia gastrointestinal. Discrasia sanguínea. Perros deshidratados, hipovolémicos o hipotensos. **Observaciones** Usar con precaución en perros de edad avanzada. En trastornos asociados a infección bacteriana, instaurar el tratamiento antimicrobiano apropiado. En el caso de ingestión consulte con un médico. Lávese las manos después de manipular el producto. No administrar con otros AINEs o glucocorticoides con intervalos menores de 24 h. No usar con fármacos potencialmente nefrotóxicos. No sobrepasar la dosis establecida. Conservar en el envase original a temperatura inferior a 25°C. Eliminar los residuos según normativa vigente. **Reacciones adversas** Vómitos, heces blandas/diarrea, sangre oculta en heces, pérdida de apetito y letargia. Posibles reacciones adversas idiosincrásicas renales o hepáticas. KRKA, d.d., Novo mesto, Eslovenia. **Nº de registro** Carprox vet 20 mg comprimidos para perros 2174 ESP. Carprox vet 50 mg comprimidos para perros 2175 ESP. Carprox vet 100 mg comprimidos para perros 2176 ESP.

Con prescripción veterinaria.

INFLACAM

Antiinflamatorio



Composición

Suspensión oral: meloxicam 1,5 mg/ml. Comprimidos masticables: meloxicam 1 y 2,5 mg por comprimido.

Indicaciones

Alivio de la inflamación y el dolor en trastornos músculo-esqueléticos agudos y crónicos en perros.

Posología y modo de empleo

Tratamiento inicial: dosis única de 0,2 mg/kg.

Mantenimiento: 0,1 mg/kg/día.

Presentaciones

Inflacam 1,5 mg/ml: frascos con 15 y 42 ml.

Inflacam 1 mg: caja con 100 cp.

Inflacam 2,5 mg: caja con 100 cp.



Contraindicaciones Gestación, lactancia, trastornos gastrointestinales, alteración hepática, cardíaca o renal, trastornos hemorrágicos. Deshidratación, hipovolemia o hipotensión. Hipersensibilidad al producto. Perros menores de 6 semanas y de 4 kg en el caso de los comprimidos. **Observaciones** No administrar con otros AINEs, glucocorticoides, diuréticos, anticoagulantes ni aminoglucósidos. Infrecuentemente puede producir pérdida del apetito, vómitos, diarrea, sangre oculta en las heces e insuficiencia renal. En muy raros casos: diarrea hemorrágica, hematemesis, úlceras gastrointestinales y elevación de las enzimas hepáticas. En estos casos se debe interrumpir el tratamiento. Los efectos adversos suelen ser transitorios pero en muy raras ocasiones pueden ser graves o mortales. El pre-tratamiento con antiinflamatorios puede aumentar los efectos adversos. En caso de sobredosificación administrar tratamiento sintomático. Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. Las personas con hipersensibilidad a los AINEs deberán evitar el contacto. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico. Eliminar los residuos según las normativas locales. **Nº de registro** Inflacam 1,5 mg/ml suspensión oral para perros 15 ml EU/2/11/134/001, 42 ml EU/2/11/134/002. Inflacam 1 mg comprimidos masticables para perros EU/2/11/134/012, Inflacam 2,5 mg comprimidos masticables para perros EU/2/11/134/014.

Con prescripción veterinaria.

INFLACAM INYECTABLE

Antiinflamatorio



Composición Meloxicam 5 mg/ml en solución inyectable.

Indicaciones Alivio de la inflamación y el dolor en trastornos músculo-esqueléticos y en el postoperatorio en perros. Reducción del dolor postoperatorio después de la cirugía menor de tejidos blandos en gatos.

Posología y modo de empleo

Perros: *Trastornos músculo-esqueléticos* 0,2 mg/kg vía SC (= 0,4 ml/10 kg peso). Continuar tratamiento 24 horas después con Inflacam suspensión oral o comprimidos masticables (0,1 mg/kg). *Postoperatorio* 0,2 mg/kg vía IV o SC (= 0,4 ml/10 kg).

Gatos: *Postoperatorio* 0,3 mg/kg (= 0,06 ml/kg) vía SC.

No perforar el envase más de 42 veces.

Presentación Envase de 20 ml.

Contraindicaciones Trastornos gastrointestinales, hemorrágicos, hepáticos, cardíacos o renales. Hipersensibilidad. Animales de menos de 6 semanas. Gatos de menos de 2 kg. Gestación y lactancia. **Observaciones** No usar en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos. En gatos, no administrar ningún tratamiento de seguimiento con otros AINE ya que no se ha establecido una posología adecuada. Puede producir reacciones adversas típicas de los AINE, como pérdida del apetito, vómitos, diarrea, sangre oculta en las heces, letargia e insuficiencia renal (infrecuente). Puede producir elevación de las enzimas hepáticas, reacciones anafilactoides, diarrea hemorrágica, hematemesis, y úlcera gastrointestinal (muy raro). La autoinyección accidental puede producir dolor, consulte con un médico. Las personas con hipersensibilidad a los AINE deben evitar el contacto. **Interacciones** No administrar con otros AINE, glucocorticosteroides, fármacos nefrotóxicos, diuréticos, anticoagulantes, antibióticos aminoglucósidos u otras sustancias con alta afinidad a las proteínas. **Anestesia** En animales de riesgo considerar la fluidoterapia. El uso combinado de AINEs y anestésico puede aumentar el riesgo para la función renal. **Nº de registro** Inflacam 5 mg/ml solución inyectable para perros y gatos EU/2/11/134/016 20 ml.

Con prescripción veterinaria.



TRAMVETOL 50 mg

Comprimidos con aroma a carne para el dolor agudo y crónico leve en perros



Composición

Tramadol (como hidrocloreuro) 43,9 mg, equivalente a 50 mg de tramadol clorhidrato.

Indicaciones

Alivio del dolor agudo y crónico leve en los tejidos blandos y el sistema musculoesquelético.

Posología y modo de empleo

2-4 mg clorhidrato de tramadol/kg cada 8 horas. Intervalo mínimo entre dosis: 6 horas. La dosis máxima diaria recomendada es de 16 mg/kg. La pauta posológica óptima debe adaptarse individualmente.

Presentaciones

Caja de 3 blísteres de 10 comprimidos.



Contraindicaciones No administrar junto con antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la monoaminoxidasa e inhibidores de la recaptación de serotonina. No usar en caso de hipersensibilidad al tramadol o a algún excipiente. No usar en animales con epilepsia. **Reacciones adversas** Con frecuencia: sedación leve y somnolencia, especialmente en dosis más altas. Infrecuentemente: náuseas y vómitos. En raras ocasiones: hipersensibilidad, en que se deberá interrumpir el tratamiento. En muy raras ocasiones: convulsiones en perros con un umbral de convulsiones bajo. **Gestación, lactancia y fertilidad** Utilizar únicamente con la evaluación beneficio/riesgo. **Sobredosificación** Miosis, vómitos, colapso cardiovascular, alteraciones de conciencia hasta coma, convulsiones y depresión respiratoria hasta parada respiratoria. Tratamiento: mantener vía respiratoria permeable, medidas de apoyo de la función respiratoria y cardíaca. Inducir vómito/lavado gástrico. El uso de naloxona deberá valorarse caso por caso. En caso de convulsiones: diazepam. **Precauciones** Los perros se deben monitorear regularmente. Usar con precaución en perros con insuficiencia renal o hepática. Mantener fuera del alcance de los niños. Las personas con hipersensibilidad al tramadol deberán evitar el contacto. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico. Lávese las manos después de su uso. **Nº de registro** 3843 ESP.

Con prescripción veterinaria.

TRAMVETOL 50 mg/ml

Solución inyectable para el dolor postoperatorio leve en perros



Composición

Tramadol (como clorhidrato) 43,9 mg (equivalentes a 50 mg de tramadol clorhidrato) por ml.

Indicaciones

Reducción del dolor postoperatorio leve.

Posología y modo de empleo

2-4 mg clorhidrato de tramadol/kg vía IV o IM (= 0,04-0,08 ml/kg) cada 6-8 horas. La dosis máxima diaria recomendada es de 16 mg/kg. La administración IV debe realizarse muy lentamente. La pauta posológica óptima debe adaptarse individualmente.

Presentaciones

Caja con 10 ampollas de 1 ml.



Contraindicaciones No administrar junto con antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la monoaminoxidasa e inhibidores de la recaptación de serotonina. No usar en caso de hipersensibilidad al tramadol o a algún excipiente. No usar en animales con epilepsia. **Reacciones adversas** Ocasionalmente: náuseas y vómitos. En raras ocasiones: hipersensibilidad, en que se deberá interrumpir el tratamiento. **Gestación, lactancia y fertilidad** Utilizar únicamente con la evaluación beneficio/riesgo. **Sobredosificación** Miosis, vómitos, colapso cardiovascular, alteraciones de conciencia hasta coma, convulsiones y depresión respiratoria hasta parada respiratoria. Tratamiento: mantener vía respiratoria permeable, medidas de apoyo de la función respiratoria y cardíaca. El uso de naloxona deberá valorarse caso por caso (puede aumentar convulsiones). En caso de convulsiones: diazepam. **Precauciones** Los perros se deben monitorear regularmente. Usar con precaución en perros con insuficiencia renal o hepática. Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos. Lávese las manos después de su uso. En caso de exposición ocular accidental, enjuague con agua limpia. En caso de auto inyección accidental, consulte con un médico. Administración exclusiva por el veterinario (en administraciones iv) o bajo su supervisión y control. **Nº de registro** 3844 ESP.

Con prescripción veterinaria.

MEDETOR 1 mg/ml

Sedante-hipnótico en solución inyectable



Composición

Hidrocloruro de medetomidina 1,0 mg/ml.

Indicaciones

Sedación. Medicación previa a la anestesia general.

Posología y modo de empleo

Perros: vía intravenosa o intramuscular.

Sedación: 750 µg por vía intravenosa o 1000 µg por vía intramuscular de hidrocloruro de medetomidina por m² de superficie corporal.

Gatos: vía intramuscular. Sedación moderada:

50-150 µg/kg (0,05-0,15 ml/kg). Anestesia: 80 µg por kg de peso vivo (0,08 ml/kg) y 2,5 a 7,5 mg de ketamina/kg.

Presentación

1 vial de vidrio con 10 ml.



Contraindicaciones Afecciones cardiovasculares o respiratorias severas y disfunción renal o hepática. Trastornos mecánicos del tracto gastrointestinal. En ausencia de datos, gestación y lactancia. Diabetes mellitus. Estado de shock, emaciación o debilitación seria. Hipersensibilidad al producto. Problemas oculares en los que un aumento de presión intraocular sería perjudicial.

Observaciones Puede causar depresión respiratoria, cianosis, bradicardia con bloqueo atrioventricular, extrasistolia, vasoconstricción coronaria, disminución del rendimiento cardíaco, vómitos, aumento de diuresis, hipotermia, dolor en el punto de inyección, hiperglucemia reversible y temblores musculares. En caso de ingestión, autoinyección o contacto accidental consulte con un médico. Evitar el contacto con piel, ojos o mucosas. Tomar precauciones especiales en mujeres embarazadas. En ausencia de estudios, no debe mezclarse con otros medicamentos en la misma jeringa. No utilizar con amins simpaticomiméticas. Los efectos de la medetomidina pueden verse antagonizados por la administración de atipamezol o yohimbina. No congelar. **Nº de registro** Medetor 1 mg/ml solución inyectable para perros y gatos 1778-ESP.

Con prescripción veterinaria.



REVERTOR

Antisedante en solución inyectable

Composición

Hidrocloruro de atipamezol 5 mg/ml.

Indicaciones

Antagonista $\alpha 2$ selectivo indicado para invertir los efectos sedativos de la medetomidina.

Posología y modo de empleo

5 veces la dosis previa de medetomidina en μg vía intramuscular; para preparaciones con 1 mg de hidrocloruro de medetomidina por ml, utilizar un volumen igual de Revertor.

Presentación

Envase de 10 ml.



Contraindicaciones Reproductores, afecciones hepáticas o renales, preñadas y lactantes. **Observaciones** No administrar con otros medicamentos de acción central como diazepam, acepromacina u opiáceos. Puede producir hipotensión durante los primeros 10 min. Puede producir hiperactividad, taquicardia, salivación, vocalización atípica, temblores musculares, vómitos, aumento del ritmo respiratorio y episodios de emisión urinaria y defecación descontrolados. Proteger de la luz. **Nº de registro** Revertor 5 mg/ml solución inyectable para perros 1882-ESP.

Con prescripción veterinaria.

VETFLURANE

Inducción y mantenimiento de la anestesia general

Composición Isoflurano 1.000 mg/g por cada ml.

Indicaciones Inducción y mantenimiento de la anestesia general.

Posología y modo de empleo Administrar en oxígeno o mezclas de oxígeno/óxido nitroso utilizando un vaporizador correctamente calibrado en un circuito anestésico adecuado. Las concentraciones sugeridas solo son una guía pues dependen de muchas variables. Los medicamentos utilizados para la premedicación deben seleccionarse para cada animal teniendo en cuenta la especie y las interacciones. La recuperación suele ser fácil y rápida. **Caballos** Inducir con tiopental sódico, ketamina o guaifenesina y a continuación usar concentraciones del 3 al 5% de isoflurano. *Inducción en potros:* 3 - 5% en oxígeno en flujo elevado. *Mantenimiento:* 1,5% - 2,5% **Perros** *Inducción:* mascarilla facial usando hasta un 5 % de isoflurano. *Mantenimiento:* 1,5% - 2,5% **Gatos** *Inducción:* mascarilla facial usando hasta un 4%. *Mantenimiento:* 1,5% - 3% **Aves** *Inducción:* 3 - 5%. *Mantenimiento:* depende de las especies y del animal, generalmente 2 - 3%. 0,6 - 1% en algunas especies de cigüeñas y garzas. 4 - 5% en algunos buitres y águilas. 3,5 - 4% en algunos patos y gansos **Reptiles** *Inducción:* 2 - 4% de isoflurano. *Mantenimiento:* 1 - 3% **Ratas, ratones, hámsters, chinchillas, gerbos, cobayas y hurones** *Inducción:* 2 - 3%. *Mantenimiento:* 0,25 - 2%.

Presentación Frasco de 250 ml.

Contraindicaciones Susceptibilidad conocida a hipertermia maligna. Hipersensibilidad al isoflurano o a otro agente halogenado. **Observaciones** El uso concomitante de sedantes o analgésicos reduce el nivel de isoflurano necesario. Antes de la cirugía administre analgesia adecuada. En cardiopatías, lactantes y gestantes evalúe beneficio/riesgo. Durante la anestesia, monitorice la respiración y el pulso, mantenga las vías respiratorias libres y oxigene debidamente los tejidos. Para el profesional: No respire el vapor. Consulte las normas estándar de exposición al isoflurano. Los quirófanos deben estar provistos de ventilación. Las mujeres embarazadas y en lactancia no deben tener contacto con el medicamento. En anestesia general prolongada es preferible la intubación endotraqueal a la mascarilla. Utilice filtros de carbón con el equipo de depuración. Elimine inmediatamente cualquier derrame con material inerte y absorbente. Lave las salpicaduras en la piel y los ojos, y evite el contacto con la boca. En caso de exposición accidental grave acuda urgentemente al médico. Conservar a menos de 25 °C. Proteger de la luz y del calor. Conservar en el envase original perfectamente cerrado. El tiempo de espera en caballos de carne es de 2 días. No usar en yeguas que produzcan leche para consumo humano. **Reacciones adversas** Hipotensión y depresión respiratoria. Arritmias cardíacas y bradicardia (raro). Daño hepático e hipertermia maligna (muy raro, en animales susceptibles). La sobredosificación puede producir depresión cardio-respiratoria profunda. Tratar la parada respiratoria con ventilación asistida y la depresión cardiovascular con expansores del plasma, agentes presores y antiarrítmicos. En caso de parada cardíaca realice reanimación cardiopulmonar. **Nº de registro** VETFLURANE 1.000 mg/g. Líquido para inhalación del vapor para caballos, perros, gatos, pájaros ornamentales, reptiles, ratas, ratones, hámsters, chinchillas, gerbos, cobayas y hurones 2199 ESP.

Con prescripción veterinaria.



ZOLETIL

Anestésico general en solución extemporánea inyectable



Composición

Zoletil 50: tiletamina 25 mg/ml y zolacepam 25 mg/ml.

Zoletil 100: tiletamina 50 mg/ml y zolacepam 50 mg/ml.

Indicaciones

Anestesia general.

Posología y modo de empleo

La posología se expresa en mg de producto total (tiletamina + zolacepam).

Perros: de 7 a 25 mg/kg p.v., por vía intramuscular o de 5 a 10 mg/kg p.v. por vía intravenosa dependiendo del tipo de intervención.

Gatos: de 10 a 15 mg/kg p.v., por vía intramuscular o de 5 a 7,5 mg/kg p.v. por vía intravenosa dependiendo del tipo de intervención.

Presentaciones

50 y 100 mg. Envase con frasco con polvo liofilizado y frasco con 5 ml de disolvente.



Contraindicaciones No usar en animales con graves descompensaciones cardíacas y respiratorias, insuficiencia pancreática e hipertensión craneal. No usar en caso de hipersensibilidad conocida a las sustancias activas o a algún excipiente, cesáreas, tratamiento previo con organofosforados sistémicos. **Reacciones adversas** Trastornos neurológicos, cardiorrespiratorios y sistémicos. En fase de recuperación puede observarse anestesia prolongada y mal despertar. La mayoría de reacciones son reversibles y desaparecen al eliminarse la sustancia. **Observaciones** El efecto dura 20-60 minutos en función de la dosis. Para prolongarlo, administrar 1/3-1/2 de la dosis inicial. Se aconseja premedicar con atropina (0,05 mg/kg p.v.) por vía SC unos 15 minutos antes. No administrar con barbitúricos, curariformes, organofosforados sistémicos ni fenotiacinas. No utilizar cloranfenicol perioperatorio. Una vez reconstituida la solución se mantiene estable una semana a 4 °C, al abrigo de la luz. **Nº de registro** Zoletil 50 2571-ESP. Zoletil 100 2570-ESP.

Con prescripción veterinaria.

ENROX SABOR

Enrofloxacin en comprimidos orales



Composición

15 mg, 50 mg y 150 mg de enrofloxacin por comprimido.

Indicaciones

Infecciones bacterianas de los tractos digestivo, respiratorio y urogenital, infecciones secundarias de heridas de la piel y otitis externa.

Posología y modo de empleo

5 mg/kg p.v. al día vía oral en una o dos tomas diarias, con o sin comida, durante 5-10 días.

Presentaciones

15 mg, 50 mg y 150 mg.

Envase con 100 comprimidos.



Contraindicaciones Perros menores de 1 año o de 18 meses en razas muy grandes. Gatos menores de 8 semanas. Hipersensibilidad al producto. Epilepsia. **Observaciones** No administrar con anticoagulantes orales, teofilina, sustancias que contengan magnesio o aluminio, tetraciclinas, fenicoles o macrólidos. Durante el periodo de crecimiento rápido puede afectar al desarrollo del cartilago articular. Se han dado casos de vómitos y anorexia. El uso de fluoroquinolonas debe ser reservado para el tratamiento de casos que hayan respondido pobremente a otros antimicrobianos y, si es posible, después de un test de susceptibilidad. No superar la dosis recomendada. No debe utilizarse como profilaxis. Utilizar con precaución en deficiencia hepática o renal severa. **Nº de registro** Enrox Sabor 15 mg comprimidos para perros y gatos 2030-ESP. Enrox Sabor 50 mg comprimidos para perros 2031-ESP. Enrox Sabor 150 mg comprimidos para perros 2032-ESP.

Con prescripción veterinaria.

RILEXINE COMPRIMIDOS MASTICABLES

Antibacteriano en comprimido oral



Composición

Cefalexina monohidrato. Rilexine 75: 75 mg por comprimido. Rilexine 300: 300 mg por comprimido. Rilexine 600: 600 mg por comprimido.

Indicaciones

Tratamiento de infecciones urinarias o cutáneas causadas por microorganismos sensibles a la cefalexina.

Posología y modo de empleo

Vía oral. 15 mg de cefalexina/kg p.v./12 h, durante 5 a 28 días según la patología. Para una correcta dosis, pesar al animal. Se puede doblar la dosis en condiciones severas o agudas.

Presentaciones

Rilexine 75: cajas con 14 y 140 comprimidos.

Rilexine 300: cajas con 14 y 140 comprimidos.

Rilexine 600: cajas con 14 y 140 comprimidos.



Contraindicaciones Hipersensibilidad a beta-lactámicos. Insuficiencia renal grave. No administrar conjuntamente con sustancias potencialmente nefrotóxicas ni antibacterianos bacteriostáticos. No usar en conejos, conejillos de indias, hámsteres y jerbos. **Observaciones** Pueden aparecer ocasionalmente vómitos y diarreas. Durante la gestación o la lactancia evaluar beneficio/riesgo. Reducir la dosis en insuficiencia renal. No utilizar en cachorros menores de 1 kg o gatos menores de 9 semanas. Se recomienda confirmación del diagnóstico bacteriológico y antibiograma. No manipular en caso de alergia a betalactámicos. Lávese las manos después de su uso. En caso de ingestión accidental o desarrollo de síntomas tras la exposición consulte con un médico. No fumar, comer o beber mientras se manipula. Conservar en el embalaje original. Eliminar los residuos según normativa vigente. **Nº de registro** Rilexine 75 mg comprimidos masticables 2177 ESP. Rilexine 300 mg comprimidos masticables 2178 ESP. Rilexine 600 mg comprimidos masticables 2179 ESP.

Con prescripción veterinaria.

VETEMEX 10 mg/ml

Antiemético en solución inyectable



Composición

Maropitant 10 mg/ml.

Indicaciones

Tratamiento y prevención de vómitos y náuseas.

Posología y modo de empleo

1 mg / kg de p.v. (= 1 ml / 10 kg de p.v.) SC o IV durante un máximo de 5 días.
Administrar con más de 1 hora de antelación.

Presentación

Envase de 20 ml.

Reacciones adversas Dolor en el lugar de inyección. En gatos, muy frecuente respuesta leve o moderada a la inyección. En muy raras ocasiones, reacciones de tipo anafiláctico (edema alérgico, urticaria, eritema, colapso, disnea, palidez de membranas mucosas). **Observaciones** No se ha establecido la seguridad en perros de menos de 8 semanas, en gatos de menos de 16 semanas, ni hembras en gestación o lactancia. Usar con precaución en enfermedades hepáticas y cardíacas. Lávese las manos después de usar. En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico. Puede causar irritación en los ojos: en caso de exposición, lavar con abundante agua y consultar con un médico. **Interacciones** No usar simultáneamente con antagonistas de los canales del calcio. No mezclar con otros medicamentos en la misma jeringa. **Nº de registro** Vetemex 10 mg/ml solución inyectable para perros y gatos 3733 ESP. Administración exclusiva por el veterinario. CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH.

Con prescripción veterinaria.



SOLIGENTAL

Antibacteriano en solución oftálmica

Composición

Gentamicina 3.000 UI/ml. Trometamina 6 mg/ml. EDTA 5 mg/ml.
Metilcelulosa 10 mg/ml. Disulfito sódico 1,5 mg/ml.

Indicaciones

Conjuntivitis y queratoconjuntivitis bacterianas.

Posología y modo de empleo

Instilar en el saco conjuntival 2 gotas 3 veces al día, durante 8 días.

Presentación

Frasco cuentagotas con 5 ml.

Contraindicaciones Hipersensibilidad a aminoglucósidos o al disulfito sódico. **Observaciones** Lavarse las manos después de utilizar el producto. **Nº de registro** Soligental 1304-ESP.

Con prescripción veterinaria.



STELFONTA 1 mg/ml

Solución inyectable para el tratamiento de mastocitomas en perros



Composición

Toglato de tilganol 1 mg / ml.

Indicaciones

Tratamiento de mastocitomas caninos irresecables y no metastásicos de volumen igual o inferior a 8 cm³ accesibles a la inyección intratumoral subcutáneos (localizados en el codo o en el corvejón o distales a ellos) o cutáneos.

Posología y modo de empleo

Dosis única de 0,5 ml por cm³ de volumen tumoral vía intratumoral. Dosis máxima 0,15 ml/kg y < 4 ml por

perro. Dosis mínima 0,1 ml. Introducir por un único punto e inyectar en abanico exclusivamente en la masa tumoral. Esperar 5 segundos antes de retirar la aguja.

Presentaciones

Viales de 2 ml.



Observaciones Mantener cubierta la herida el primer día. Manipular con guantes. En caso necesario se puede administrar una segunda dosis. Administrar tratamiento concomitante con corticosteroides y antagonistas de los receptores H1 y H2. No usar en mastocitos con superficie rota ni en los márgenes quirúrgicos después de la extirpación. Administrar solo por el veterinario.

Reacciones adversas Desgranulación con hinchazón, enrojecimiento, úlceras y hemorragias gástricas, shock hipovolémico o respuesta inflamatoria sistémica. La formación de heridas es una reacción deseada y previsible. Dolor, hematoma, eritema o edema y cojera. Vómitos y taquicardia. Retracción cicatricial. Inflamación del ganglio, diarrea, anorexia, pérdida de peso, taquipnea, letargo, pirexia, disminución del apetito, aparición de una masa neoplásica nueva, cambios de comportamiento, prurito, temblor y úlceras cutáneas. Anemia, neutrofilia, aumento de los cayados, hipoalbuminemia, monocitosis. Infección/celulitis, formación de esfacelos. Neuropatía y prurito. Leucocitosis, aumento de los cayados, trombocitopenia. Convulsiones. Nódulos. Deshidratación, hemorragia, colestasis, polidipsia, poliuria, regurgitación, melena, flatulencia, incontinencia urinaria, alteraciones de la defecación, exantema maculopapuloso, abrasión, dermatitis, lameduras, inquietud. Proteinuria, trombocitosis, elevación de la ALT, la creatina cinasa y la fosfatasa alcalina, elevación de la bilirrubina, elevación del BUN, elevación de la GGT, elevación de los triglicéridos e hiperpotasemia.

Precauciones y advertencias Mantener lejos de los niños. Conservar entre 2 y 8 °C en el embalaje exterior al abrigo de la luz. No congelar. Usar inmediatamente una vez desencapsulado. Evitar la vía IV. En caso necesario administrar analgesia adicional. El uso en mucosas y extremidades podría perjudicar su funcionalidad. No se ha establecido la seguridad en menores de 12 meses. En tumores subcutáneos podría ser necesaria una incisión para el drenaje. Las personas con hipersensibilidad al producto deben evitar todo contacto. La autoinyección puede provocar reacciones graves: consultar con un médico. Irritante. Evitar la exposición de piel y ojos o la ingestión. Después de la administración se pueden producir fugas. Usar guantes y gafas protectoras. En caso de exposición lavar con agua y consultar con un médico. Seguridad no demostrada durante la gestación o la lactancia. Eliminar según normativas locales. **Nº de registro** EU/2/19/248/001.

Con prescripción veterinaria.



ALIZIN

Antiprogéstgeno en solución inyectable

Composición

Aglepristona 30 mg/ml.

Indicaciones

Inducción del aborto en perras gestantes hasta 45 días después de la monta.

Posología y modo de empleo

Aplicar dos dosis de 10 mg de aglepristona por kg de p.v., equivalente a 0,33 ml por kg de p.v. de Alizin con un intervalo de 24 horas, en la piel del cuello del animal por vía estrictamente subcutánea.

Realizar un ligero masaje en la zona de inyección. Administrar un máximo de 5 ml en cada punto de inyección.

Presentación

Viales de 10 ml.



Contraindicaciones Funciones hepáticas o renales reducidas, diabetes, hipoadrenocorticismo. Hipersensibilidad al producto. **Observaciones** Puede existir interacción con el ketoconazol, el itraconazol y la eritromicina. Puede reducir el efecto de los glucocorticoides. El aborto puede acompañarse de signos fisiológicos de parto: expulsión fetal, descarga vaginal, reducción del apetito, alteraciones del comportamiento y congestión mamaria. Después del aborto puede observarse una vuelta más temprana al estro. Confirmar el aborto a los 10 días del tratamiento. En caso de aborto parcial o fracaso del aborto, repetir el tratamiento antes de los 45 días de gestación. La inyección accidental puede ser peligrosa para una mujer embarazada, si se produce consulte a un médico. No conservar a temperaturas superiores a 25 °C. **Nº de registro** Alizin 30 mg/ml solución inyectable 1539-ESP.

Con prescripción veterinaria.



CONTRALAC

Antilactógeno en comprimidos orales

Composición

Metergolina. Contralac 0,5 mg: 0,5 mg por comprimido. Contralac 2 mg: 2 mg por comprimido.

Indicaciones

Supresión de la lactación y otras manifestaciones de pseudogestación.

Supresión de la lactación posparto no deseada.

Posología y modo de empleo

0,2 mg de metergolina/kg p.v./día, repartido en 2 tomas. Se recomienda administrar durante 8 días, aunque se suelen observar curaciones completas al cabo del 4º día.

Presentaciones

0,5 mg y 2 mg. Caja con 16 comprimidos.



Observaciones Se han descrito interacciones con sustancias L-dopaminérgicas. Se pueden producir vómitos o diarreas débiles, excitación e hiperactividad. La acción sinérgica con barbitúricos aumenta el efecto depresor del SNC. Mantener al abrigo de la luz, en lugar fresco y seco. **Nº de registro** Contralac 0,5 mg 809-ESP. Contralac 2 mg 2622-ESP.

Con prescripción veterinaria.



SUPRELORIN

Implante subcutáneo para esterilización médica reversible

Composición

Deslorelina acetato 4,7 mg.

Indicaciones

Inducción de la esterilidad transitoria en perros machos sexualmente maduros, sin castrar y sanos.

Posología y modo de empleo

Un implante por perro por vía subcutánea independientemente del tamaño del animal.

Presentación

Caja con dos implantes.



Observaciones La esterilidad se consigue a las 6 semanas de iniciar el tratamiento y dura como mínimo 6 meses. Puede observarse hinchazón moderada en el lugar de implantación durante 14 días. Provoca una disminución del tamaño de los testículos. Las mujeres embarazadas no deberán administrar el producto. Conservar en nevera (entre 2 y 8 °C). No congelar. **Nº de registro** Suprelorin 4,7 mg implante para perros EU/2/072/001.

Con prescripción veterinaria.



YPOZANE

Antiandrógeno en comprimidos orales

Composición

1,875 mg, 3,75 mg, 7,5 mg o 15 mg de acetato de osaterona por comprimido.

Indicaciones

Tratamiento de la hipertrofia benigna de próstata.

Posología y modo de empleo

0,25-0,5 mg de acetato de osaterona por kg de peso vivo, una vez al día durante 7 días.

Perros de 3 a 7,5 kg: 1 comprimido de 1,875 mg.

Perros de 7,5 a 15 kg: 1 comprimido de 3,75 mg.

Perros de 15 a 30 kg: 1 comprimido de 7,5 mg.

Perros de 30 a 60 kg: 1 comprimido de 15 mg.

Presentaciones

1,875 mg / 3,75 mg / 7,5 mg / 15 mg.

Caja con 7 comprimidos.



Observaciones Puede producirse aumento del apetito, cambios del comportamiento, vómitos y/o diarrea, poliuria/polidipsia, letargia, síndrome de feminización y reducción transitoria del cortisol en plasma. En prostatitis, administrar con antimicrobianos. El inicio de la respuesta clínica es de unas 2 semanas y suele persistir por lo menos 5 meses. Lavarse las manos después del uso. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico. Las mujeres en edad fértil deben evitar el contacto o manipular con guantes. **Nº de registro** Ypozane 1,875 mg comprimidos para perros EU/2/06/068/001. Ypozane 3,75 mg comprimidos para perros EU/2/06/068/002. Ypozane 7,5 mg comprimidos para perros EU/2/06/068/003. Ypozane 15 mg comprimidos para perros EU/2/06/068/004.

Con prescripción veterinaria.

HIGIENE

- ☒ Champú fisiológico
- ☒ Limpiador auricular
- ☒ Veggiedent FR3SH
- ☒ Veggiedent Zen
- ☒ Vet aquadent

CHAMPÚ FISIOLÓGICO

Champú de uso frecuente para cualquier tipo de piel, pelo y raza



Composición

Bases lavantes suaves, agentes nutritivos y reestructurantes (ceramidas A2 y ácidos grasos esenciales). pH fisiológico.

Indicaciones

Champú hipoalergénico con propiedades nutritivas y reestructurantes para el cuidado de la piel y el pelaje.

Propiedades

Respeta la integridad de la barrera cutánea y el equilibrio de la piel. Actúa como barrera de protección, por su fórmula con agentes rehidratantes y reestructurantes específicos. Tecnología patentada para neutralizar los olores. Agradable aroma a coco. Facilita la aplicación con una sola mano gracias a su envase ergonómico y válvula antigoteo. Dosificación más precisa.

Posología y modo de empleo

Aplicar el champú sobre el pelo previamente mojado. Frotar todo el cuerpo del animal hasta obtener abundante espuma. Dejar actuar 1-2 minutos y aclarar con agua tibia. En caso necesario, repetir la operación.

Presentación

Envase con 200 ml.

Observaciones La válvula del tapón permite liberar la dosis adecuada al presionar el frasco. Evitar la exposición prolongada a temperaturas superiores a 30 °C. **Nº de registro** Champú fisiológico 0383-H.



LIMPIADOR AURICULAR

Limpiador ótico en solución



Composición

Solución isotónica micelar compuesta de glicéridos y tensoactivos. pH fisiológico.

Indicaciones

Higiene regular del oído.

Propiedades

Disminuye el riesgo de infecciones de oído. Facilita la emulsión y retirada del cerumen. Descongestiona y limpia suavemente el oído. Tecnología patentada para neutralizar los olores. Diseño ergonómico. Fácil de usar.

Posología y modo de empleo

Retirar el tapón e introducir la cánula en el interior de cada oreja. Presionar una sola vez y realizar un masaje suave en la base de la oreja. Limpiar el interior con un algodón humedecido de producto. Aplicar 1-2 veces por semana.

Presentación

Envase con 100 ml.



Observaciones Evitar la exposición a temperaturas superiores a 30 °C. N° de registro Limpiador auricular 0399 H.

VEGGIEDENT FR3SH

Láminas masticables contra la formación de la placa dental y el sarro



Composición

Almidón de maíz, glicerina, concentrado de proteína de soja, harina de arroz, levadura de cerveza, sorbitol, mazorca de maíz, poliol (eritritol), inulina de achicoria, concentrado de granada.

Indicaciones

Acción antisarro y antiplaca. Gracias a la tecnología FR3SH que incorpora granada, eritritol e inulina, combate las causas del mal aliento a 3 niveles: limpieza, frescor y digestivo.

Propiedades

Reduce el 37% la formación de la placa y el 70% la formación del sarro. Su diseño en “Z” facilita la acción mecánica abrasiva sobre el sarro y la placa. Su firme consistencia garantiza una masticación prolongada. Su composición 100% vegetal lo hace muy palatable, digestible y apto para animales con alergias a proteínas de origen animal. Contenido moderado en calorías para su administración en perros con sobrepeso.

Posología y modo de empleo

Administrar una lámina al día entre comidas asegurando la disponibilidad de agua fresca.

Presentaciones

Bolsa con 15 láminas: XS (razas pequeñas y cachorros <5 kg), S (razas pequeñas 5-10 kg), M (razas medianas 10-30 kg), L (razas grandes >30 kg).

Envases individuales: XS (caja con 45 unidades), S (caja con 30 unidades), M (caja con 28 unidades), L (caja con 24 unidades).

Observaciones Conservar en lugar fresco a temperatura ambiente.



VEGGIEDENT ZEN

Láminas masticables contra la formación de la placa dental y del sarro que proporcionan bienestar a perros inquietos



Composición

Almidón de maíz, glicerina, concentrado de proteína de soja, harina de arroz, levadura de cerveza, sorbitol, mazorca de maíz, té verde concentrado 0,9 %, poliol (eritritol), inulina de achicoria y concentrado de granada.

Indicaciones

Control de la placa dental y del sarro. Ayuda a mantener el aliento fresco y sano. Gracias a la tecnología FR3SH que incorpora granada, eritritol e inulina, combate las causas del mal aliento a 3 niveles: limpieza, frescor y digestivo. Además, incluye L-teanina, aminoácido que se encuentra en el concentrado de té verde, conocido por sus propiedades relajantes.

Propiedades

Reduce el 37% la formación de la placa y el 70% la formación del sarro. Con efecto relajante y de bienestar para los perros más inquietos.

Posología y modo de empleo

Administrar una lámina al día entre comidas asegurando la disponibilidad de agua fresca.

Presentaciones

Bolsa con 15 láminas: XS (razas pequeñas y cachorros <5 kg), S (razas pequeñas 5-10 kg), M (razas medianas 10-30 kg), L (razas grandes >30 kg).



Observaciones Conservar en lugar fresco a temperatura ambiente.

VET AQUADENT

Solución para combatir el mal aliento y la formación de la placa



Composición

Glicerina y xilitol.

Indicaciones

Solución para la higiene oral y dental diaria de perros y gatos con dentición adulta. Evita la placa dental, la formación de sarro y combate el mal aliento.

Propiedades

Combate el mal aliento. A los dos meses, reduce la formación de la placa. Muy fácil de administrar. Incluye un vaso dosificador.

Posología y modo de empleo

Añadir 2,5 ml por cada 250 ml de agua.

Reemplazar el agua de bebida cada 24 horas, incluso si la totalidad del agua no se ha consumido.

Presentaciones

Envases de 250 ml y 500 ml.



ADITIVOS PARA SOLUCIÓN DENTAL - FRANCIA
2017-2018



NUTRICIÓN

Veterinary HPM Gatos esterilizados

- ☑ Baby Pre Neutered Cat
- ☑ Junior Neutered Cat
- ☑ Adult Neutered Cat
- ☑ Adult with Salmon Neutered & Entire Cat
- ☑ Senior Neutered Cat

Veterinary HPM Perros esterilizados

- ☑ Adult Neutered Dog Small & Toy
- ☑ Senior Neutered Dog Small & Toy
- ☑ Adult Neutered Dog Large & Medium
- ☑ Senior Neutered Dog Large & Medium
- ☑ Adult Neutered Sensitive Digest L& M

Veterinary HPM Perros pequeños y miniatura

- ☑ Baby Dog Small & Toy
- ☑ Adult Dog Small & Toy
- ☑ Senior Dog Small & Toy

Veterinary HPM Perros grandes y medianos

- ☑ Baby Dog Large & Medium
- ☑ Junior Dog Special Medium
- ☑ Junior Dog Special Large
- ☑ Adult Dog Large & Medium
- ☑ Senior Dog Large & Medium
- ☑ Adult Sensitive Digest L & M

Veterinary HPM Dietetic Range. Gatos

- ☑ U1 Struvite dissolution
- ☑ U2 Dissolution & prevention
- ☑ U3 Urinary WIB
- ☑ W1 Weight loss & diabetes
- ☑ W2 Weight loss & control
- ☑ K1 Kidney support
- ☑ G1 Digestive support
- ☑ A2 Hypoallergy Food intolerance
- ☑ D1 Dermatology support

Veterinary HPM Dietetic Range. Perros

- ☑ W1 Weight loss & diabetes
- ☑ W2 Weight loss & diabetes
- ☑ J1 Joint & Mobility
- ☑ A2 Hypoallergy Food intolerance
- ☑ D1 Dermatology support
- ☑ G1 Digestive support
- ☑ K1 Kidney support
- ☑ U1 Dissolution & prevention

Suplementos nutricionales

- ☑ Nutribound
- ☑ Nutri-plus gel
- ☑ Pronefra



BABY PRE NEUTERED CAT



Indicaciones

Dieta completa para gatitos:

- Desde el destete y hasta los 12 meses de edad, o antes de la esterilización.
- Gatas en gestación/lactación.

Propiedades nutricionales

Densidad energética alta y grado elevado de digestibilidad.

Aporte proteico elevado (45%). Materia grasa bruta (20%).

Bajo contenido en almidón. El nivel elevado de proteínas de origen animal ayuda a estabilizar el pH para un sistema urinario saludable.

Niveles equilibrados de minerales y de ácidos grasos esenciales omega-3 y omega-6.

Ingredientes funcionales

Refuerzo de la inmunidad: betaglucanos de levadura.

Seguridad digestiva: *lactobacillus acidophilus* + montmorillonita + fructooligosacáridos.

Control del sarro dental: ascorbil fosfato de sodio.

Presentaciones

Sacos de 1,5 kg y 3 kg.



JUNIOR NEUTERED CAT



Indicaciones

Dieta completa para gatos jóvenes:

- Desde la esterilización y hasta los 12 meses de edad.

Propiedades nutricionales

Densidad energética moderada. Niveles bajos de grasa y cantidad incrementada de fibra. Aporte proteico elevado (45%). Materia grasa bruta (16%). Bajo contenido en almidón. El nivel elevado de proteínas de origen animal ayuda a estabilizar el pH para un sistema urinario saludable.

Ingredientes funcionales

Seguridad digestiva: *Lactobacillus acidophilus* + montmorillonita + fructooligosacáridos.

Salud urinaria: cinarina de alcachofa + quitosán.

Control del sarro dental: ascorbil fosfato de sodio.

Presentaciones

Sacos de 1,5 kg y 3 kg.





ADULT NEUTERED CAT

Indicaciones

Dieta completa para gatos adultos:

- Esterilizados, a partir del año de edad.

Propiedades nutricionales

Bajo aporte energético. Aporte proteico elevado (44,5%). Materia grasa bruta (13,5%). Bajo contenido en almidón. Nivel elevado de proteínas de origen animal ayuda a mantener un sistema urinario y una función renal saludable. Contenido controlado de fósforo.

Ingredientes funcionales

Seguridad digestiva: *lactobacillus acidophilus* + montmorillonita + fructooligosacáridos.

Salud urinaria: cinarina de alcachofa + quitosán.

Control del sarro dental: ascorbil fosfato de sodio.

Presentaciones

Sacos de 1,5 kg, 3 kg y 7 kg.





ADULT WITH SALMON NEUTERED & ENTIRE CAT

Indicaciones

Dieta completa para gatos adultos:

- Esterilizados y no esterilizados, a partir del año de edad.

Propiedades nutricionales

Bajo aporte energético. Aporte proteico elevado (45%). Materia grasa bruta (16%). Bajo contenido en almidón. Nivel elevado de proteínas de origen animal ayuda a mantener un sistema urinario y una función renal saludable. Contenido controlado de fósforo.

Ingredientes funcionales

Seguridad digestiva: *lactobacillus acidophilus* + montmorillonita + fructooligosacáridos.

Salud urinaria: cinarina de alcachofa + quitosán.

Control del sarro dental: ascorbil fosfato de sodio.

Presentaciones

Sacos de 1,5 kg, 3 kg y 7 kg.



SENIOR NEUTERED CAT



Indicaciones

Dieta completa para gatos:

- Esterilizados, a partir de los 10 años de edad.

Propiedades nutricionales

Densidad energética moderadamente alta. Aporte proteico elevado (38%). Materia grasa bruta (16%). Bajo contenido en almidón. Nivel elevado de proteínas de origen animal ayuda a mantener un sistema urinario y una función renal saludable. Contenido de fósforo un 25% más bajo que el de la forma adulta.

Ingredientes funcionales

Seguridad digestiva: *Lactobacillus acidophilus* + montmorillonita + fructooligosacáridos.

Soporte articular y muscular: condroitín sulfato + quitosán.

Control del sarro dental: ascorbil fosfato de sodio.

Presentaciones

Sacos de 1,5 kg, 3 kg y 7 kg.



ADULT NEUTERED DOG Small & Toy



Indicaciones

Dieta completa para perros adultos esterilizados (o con tendencia a ganar peso):

- Para perros de razas pequeñas y miniatura a partir de los 10 meses de edad.

Propiedades nutricionales

Densidad energética controlada. Niveles bajos de grasa y cantidad incrementada de fibra. Aporte proteico elevado (35%). Materia grasa bruta (14%). Fuentes de almidón con bajo índice glucémico. Fórmula poco alergénica.

Ingredientes funcionales

Control del peso: L-carnitina.

Seguridad digestiva: *Lactobacillus acidophilus* + sepiolita + fructooligosacáridos.

Control del sarro dental: trifosfato pentasódico.

Presentaciones

Sacos de 1,5 kg, 3 kg y 7 kg.



SENIOR NEUTERED DOG Small & Toy



Indicaciones

Dieta completa para perros sénior esterilizados (o con tendencia a ganar peso):

- Para perros de razas pequeñas (peso adulto 5-10 kg) a partir de los 10 años de edad.
- Para perros de razas miniatura (peso adulto <5 kg) a partir de los 12 años de edad.

Propiedades nutricionales

Densidad energética controlada. Niveles bajos de grasa y cantidad incrementada de fibra. Aporte proteico elevado (32%). Materia grasa bruta (12%). Fuentes de almidón con bajo índice glucémico. Contenido reducido de fósforo. Rico en vitamina E. Fórmula poco alergénica.

Ingredientes funcionales

Control del peso: L-carnitina.

Seguridad digestiva: *Lactobacillus acidophilus* + sepiolita + fructooligosacáridos.

Soporte articular y muscular: condroitín sulfato + quitosán.

Control del sarro dental: trifosfato pentasódico.

Presentaciones

Sacos de 1,5 kg, 3 kg y 7 kg.





ADULT NEUTERED DOG Large & Medium

Indicaciones

Dieta completa para perros adultos esterilizados (o con tendencia a ganar peso):

- Para perros de razas grandes (peso adulto >25 kg) a partir de los 18 meses de edad.
- Para perros de razas medianas (peso adulto 10-25 kg) a partir de los 12 meses de edad.

Propiedades nutricionales

Densidad energética controlada. Niveles bajos de grasa y cantidad incrementada de fibra. Aporte proteico elevado (35%). Materia grasa bruta (14%). Fuentes de almidón con bajo índice glucémico. Fórmula poco alergénica.

Ingredientes funcionales

Control del peso: L-carnitina.

Seguridad digestiva: *Lactobacillus acidophilus* pasteurizados.

Soporte articular y muscular: condroitín sulfato + quitosán + extracto de *Yucca schidigera*.

Presentaciones

Sacos de 3 kg, 7 kg y 12 kg.





SENIOR NEUTERED DOG Large & Medium

Indicaciones

Dieta completa para perros sénior esterilizados (o con tendencia a ganar peso):

- Para perros de razas grandes (peso adulto >25 kg) a partir de los 6 años de edad.
- Para perros de razas medianas (peso adulto 10-25 kg) a partir de los 8 años de edad.

Propiedades nutricionales

Densidad energética controlada. Niveles bajos de grasa y cantidad incrementada de fibra. Aporte proteico elevado (32%). Materia grasa bruta (12%). Fuentes de almidón con bajo índice glucémico. Contenido reducido de fósforo. Rico en vitamina E. Fórmula poco alergénica.

Ingredientes funcionales

Control del peso: L-carnitina.

Soporte articular y muscular: condroitín sulfato + quitosán.

Seguridad digestiva: *Lactobacillus acidophilus* + sepiolita + fructooligosacáridos.

Presentaciones

Sacos de 3 kg, 7 kg y 12 kg.



ADULT NEUTERED SENSITIVE DIGEST Large & Medium



Indicaciones

Dieta completa para perros adultos esterilizados con sensibilidad digestiva:

- Para perros de razas grandes (peso adulto >25 kg) a partir de los 18 meses de edad.
- Para perros de razas medianas (peso adulto 10-25 kg) a partir de los 12 meses de edad.

Propiedades nutricionales

Elevada seguridad digestiva. Contenido proteínico adaptado (29%).

Materia grasa bruta (14%). Refuerzo del sistema digestivo.

Mejora de la consistencia de las heces. Control del peso corporal.

Nivel moderado de calorías. Soporte articular y muscular.

Bajo índice glucémico. Fórmula baja en alérgenos.

Ingredientes funcionales

Sepiolita (0,8 %), *Lactobacillus acidophilus* pasteurizado (7 mg/kg), extracto de *Yucca schidigera* (0,04 %). L-carnitina (330 mg/kg), condroitín sulfato (215 mg/kg), quitosán (215 mg/kg).

Presentaciones

Sacos de 3 kg y 12 kg.





BABY DOG Small & Toy

Indicaciones

Dieta completa para cachorros:

- Para perros de razas pequeñas y miniatura hasta los 10 meses de edad.

Dieta completa para perras:

- Perras de razas pequeñas y miniatura en gestación/lactación.

Propiedades nutricionales

Densidad energética alta y grado elevado de digestibilidad.

Aporte proteico elevado (36%). Materia grasa bruta (21%).

Bajo contenido en almidón. Niveles equilibrados de minerales

y de ácidos grasos esenciales omega-3 y omega-6. Fórmula

poco alergénica.

Ingredientes funcionales

Refuerzo de la inmunidad: betaglucanos de levadura.

Seguridad digestiva: *lactobacillus acidophilus* + sepiolita + fructooligosacáridos.

Control del sarro dental: trifosfato pentasódico.

Presentaciones

Sacos de 1,5 kg y 3 kg.



ADULT DOG Small & Toy



Indicaciones

Dieta completa para perros adultos no esterilizados:

- Para perros de razas pequeñas y miniatura a partir de los 10 meses de edad.

Propiedades nutricionales

Aporte optimizado de energía. Aporte proteico elevado (35%).
Materia grasa bruta (17%). Bajo contenido en almidón. Nivel elevado de proteínas de origen animal ayuda a mantener un sistema urinario y una función renal saludable. Fórmula poco alergénica.

Ingredientes funcionales

Seguridad digestiva: *Lactobacillus acidophilus* + sepiolita + fructooligosacáridos.

Soporte de la piel y el pelo: niveles elevados de proteína animal, fuentes de aminoácidos azufrados, balance de ácidos grasos esenciales omega-3 y omega-6.

Control del sarro dental: trifosfato pentasódico.

Presentaciones

Sacos de 1,5 kg, 3 kg y 7 kg.





SENIOR DOG Small & Toy

Indicaciones

Dieta completa para perros sénior no esterilizados:

- Para perros de razas pequeñas (peso adulto 5-10 kg) a partir de los 10 años de edad.
- Para perros de razas miniatura (peso adulto <5 kg) a partir de los 12 años de edad

Propiedades nutricionales

Densidad energética moderada. Aporte proteico elevado (32%).
Materia grasa bruta (14%). Fuentes de almidón con bajo índice glucémico. Contenido reducido de fósforo. Rico en vitamina E.
Fórmula poco alergénica.

Ingredientes funcionales

Seguridad digestiva: *Lactobacillus acidophilus* + sepiolita
+ fructooligosacáridos.

Soporte articular y muscular: condroitín sulfato + quitosán.

Soporte de la piel y el pelo: niveles elevados de proteína animal,
fuentes de aminoácidos azufrados, y el balance de ácidos grasos
omega-3 y omega-6.

Control del sarro dental: trifosfato pentasódico.

Presentaciones

Sacos de 1,5 kg, 3 kg y 7 kg.





BABY DOG Large & Medium

Indicaciones

Dieta completa para cachorros:

- Para cachorros de razas grandes (peso adulto >25 kg) hasta los 7 meses de edad.
- Para cachorros de razas medianas (peso adulto 10-25 kg) hasta los 6 meses de edad.

Dieta completa para perras:

- Perras de razas grandes y medianas en gestación / lactación.

Propiedades nutricionales

Densidad energética alta y grado elevado de digestibilidad. Aporte proteico elevado (36%). Materia grasa bruta (21%). Bajo contenido en almidón. Niveles equilibrados de minerales y de ácidos grasos esenciales omega-3 y omega-6. Fórmula poco alergénica.

Ingredientes funcionales

Refuerzo de la inmunidad: betaglucanos de levadura.

Seguridad digestiva: *Lactobacillus acidophilus* + sepiolita + fructooligosacáridos.

Presentaciones

Sacos de 3 kg, 7 kg y 12 kg.



JUNIOR DOG Special Medium



Indicaciones

Dieta completa para cachorros:

- Para razas medianas (peso adulto 10-25 kg), después del pico del crecimiento, esto es, de los 7 a 12 meses de edad.

Propiedades nutricionales

Densidad energética elevada, pero no excesiva. Aporte proteico elevado (36%). Materia grasa bruta (19%). Bajo contenido en almidón. Niveles equilibrados de minerales y de ácidos grasos esenciales omega-3 y omega-6. Fórmula poco alergénica.

Ingredientes funcionales

Control del peso: L-carnitina.

Seguridad digestiva: *lactobacillus acidophilus* + sepiolita + fructooligosacáridos.

Presentaciones

Sacos de 3 kg, 7 kg y 12 kg.



JUNIOR DOG Special Large



Indicaciones

Dieta completa para cachorros:

- Para razas grandes (peso adulto >25 kg), después del pico del crecimiento, esto es, de los 8 a 18 meses de edad.

Propiedades nutricionales

Densidad energética moderada. Niveles bajos de grasa y cantidad incrementada de fibra. Aporte proteico elevado (36,5%). Materia grasa bruta (15%). Bajo contenido en almidón. Niveles equilibrados de ácidos grasos esenciales omega-3 y omega-6. Fórmula poco alergénica.

Ingredientes funcionales

Control del peso: L-carnitina.

Seguridad digestiva: *lactobacillus acidophilus* + sepiolita + fructooligosacáridos.

Soporte articular y muscular: condroitín sulfato + quitosán.

Presentaciones

Sacos de 3 kg, 7 kg y 12 kg.



ADULT DOG Large & Medium



Indicaciones

Dieta completa para perros adultos no esterilizados:

- Para perros de razas grandes (peso adulto >25 kg) a partir de los 18 meses de edad.
- Para perros de razas medianas (peso adulto 10-25 kg) a partir de los 12 meses de edad.

Propiedades nutricionales

Aporte optimizado de energía. Aporte proteico elevado (35%).

Materia grasa bruta (17%). Bajo contenido en almidón. Nivel elevado de proteínas de origen animal ayuda a mantener un sistema urinario y una función renal saludable. Fórmula poco alergénica.

Ingredientes funcionales

Seguridad digestiva: *Lactobacillus acidophilus* + sepiolita + fructooligosacáridos.

Soporte articular y muscular: condroitín sulfato + quitosán.

Soporte de la piel y el pelo: niveles elevados de proteína animal, fuentes de aminoácidos azufrados, y el balance de ácidos grasos esenciales omega-3 y omega-6.

Presentaciones

Sacos de 3 kg, 7 kg, 12 kg y 16 kg.





SENIOR DOG Large & Medium

Indicaciones

Dieta completa para perros senior no esterilizados:

- Para perros de razas grandes (peso adulto >25 kg) a partir de los 6 años de edad.
- Para perros de razas medianas (peso adulto 10-25 kg) a partir de los 8 años de edad.

Propiedades nutricionales

Densidad energética moderada. Aporte proteico elevado (32%).

Materia grasa bruta (14%). Bajo contenido en almidón. Contenido reducido de fósforo. Rico en vitamina E. Fórmula poco alergénica.

Ingredientes funcionales

Seguridad digestiva: *Lactobacillus acidophilus* + sepiolita + fructooligosacáridos.

Soporte articular y muscular: condroitín sulfato + quitosán.

Soporte de la piel y el pelo: niveles elevados de proteína animal, fuentes de aminoácidos azufrados, y el balance de ácidos grasos esenciales omega-3 y omega-6.

Presentaciones

Sacos de 3 kg, 7 kg y 12 kg.





ADULT SENSITIVE DIGEST Large & Medium

Indicaciones

Dieta completa para perros adultos con sensibilidad digestiva:

- Para perros de razas grandes (peso adulto >25 kg) a partir de los 18 meses de edad.
- Para perros de razas medianas (peso adulto 10-25 kg) a partir de los 12 meses de edad.

Propiedades nutricionales

Elevada seguridad digestiva. Refuerzo del sistema digestivo. Aporte proteico adaptado (29%). Materia grasa bruta (18%). Mejora de la consistencia de las heces. Peso corporal óptimo. Masa muscular óptima. Soporte articular y muscular. Fórmula baja en alérgenos. Soporte de la piel y el pelo.

Ingredientes funcionales

Control de peso: L- carnitina.

Seguridad digestiva: *Lactobacillus acidophilus* pasteurizados + sepiolita.

Soporte articular y muscular: condroitín sulfato, quitosán y extracto de *Yucca schidigera*.

Presentaciones

Sacos de 3 kg y 12 kg.





UROLOGY • U1 Struvite dissolution

Cálculos de estruvita

Indicaciones dietéticas

Disolución de cálculos de estruvita (entre 5 y 12 semanas) y reducción de la formación de cálculos de oxalato.

Beneficios clave

RSS<1 para estruvita. Aumento del consumo de agua.
Contenido elevado de EPA+DHA (omega-3). Acidificación de la orina. Quelante de fósforo.

Propiedades nutricionales

Favorece la dilución urinaria. Baja concentración de minerales.
Aporte proteínico (44%). Materia grasa bruta (16%).
Adición de un inhibidor de oxalato. RSS<10 para oxalato.
Elevada palatabilidad.

Ingredientes funcionales

Psyllium, fructooligosacáridos, quitosán, extracto de hojas de alcachofa deshidratadas, *Lactobacillus acidophilus* pasteurizados.

Presentaciones

Sacos de 1,5 kg y 3 kg.

Contraindicaciones Crecimiento. Gestación y lactación. Enfermedad renal crónica. Insuficiencia cardíaca.





UROLOGY • U2 Dissolution & prevention

Cálculos de estruvita y oxalato cálcico

Indicaciones dietéticas

Disolución de cálculos de estruvita, prevención de la reaparición de cálculos de estruvita y reducción de la formación de cálculos de oxalato.

Beneficios clave

RSS<1 para estruvita. Aumento del consumo de agua.
Optimiza el pH urinario. Quelante de fósforo.
Control del peso corporal.

Propiedades nutricionales

Favorece la dilución urinaria. Baja concentración de minerales.
Aporte proteínico (44%). Materia grasa bruta (13,5%).
Adición de un inhibidor de oxalato. RSS<10 para oxalato.
Elevada palatabilidad.

Ingredientes funcionales

Psyllium, fructooligosacáridos, quitosán, extracto de hojas de alcachofa deshidratadas, *Lactobacillus acidophilus* pasteurizados.

Presentaciones

Sacos de 1,5 kg, 3 kg y 7 kg.

Contraindicaciones Crecimiento. Gestación y lactación. Enfermedad renal crónica. Insuficiencia cardíaca.





UROLOGY • U3 Urinary WIB

Consumo de agua y comportamiento

Indicaciones dietéticas

Prevención de la reaparición de cálculos de estruvita. Reducción de la formación de cálculos de oxalato. Cistitis idiopática felina.

Beneficios clave

Behaviour Plus Complex. RSS<1 para estruvita. Aumento del consumo de agua. Contenido elevado de EPA+DHA (omega-3). Control del peso corporal.

Propiedades nutricionales

Favorece la dilución urinaria. Baja Concentración de minerales. Aporte proteínico (44%). Materia grasa bruta (13,5%). Quelante de fósforo. Adición de un inhibidor de oxalato. RSS<10 para oxalato. Optimiza el pH urinario.

Ingredientes funcionales

Psyllium, fructooligosacáridos, quitosán, concentrado de té verde deshidratado, extracto de hojas de alcachofa deshidratadas, *Lactobacillus acidophilus* pasteurizados.

Presentaciones

Sacos de 1,5 kg y 3 kg.

Contraindicaciones Crecimiento. Gestación y lactación. Enfermedad renal crónica. Insuficiencia cardíaca.





WEIGHT • W1 Weight loss & diabetes

Obesidad (>30%) y diabetes

Indicaciones dietéticas

Reducción del exceso de peso. Regulación del aporte de glucosa (Diabetes mellitus), solo en caso de obesidad asociada. Colitis con respuesta a la fibra. Estreñimiento. Trastornos del metabolismo de los lípidos (hiperlipidemia).

Beneficios clave

Baja densidad energética. Soporte articular. Mejora el cociente masa magra / masa grasa. Contenido elevado de fibra bruta que mejora la saciedad. Bajo índice glucémico y azúcares totales.

Propiedades nutricionales

Quemador de grasa. Niveles incrementados de vitaminas y elementos traza (15 %). Palatabilidad controlada. Limita el riesgo de Enfermedad del Tracto Urinario Inferior Felino (FLUTD), Adecuada para gatos adultos y sénior.

Ingredientes funcionales

Fibra de *psyllium*, fructooligosacáridos, quitosán, extracto de hojas de alcachofa deshidratadas, condroitín sulfato, *Lactobacillus acidophilus* pasteurizado.

Presentaciones

Sacos de 1,5 kg, 3 kg y 7 kg.

Contraindicaciones Crecimiento. Gestación y lactación. Enfermedad renal crónica.





WEIGHT • W2 Weight loss & control

Sobrepeso (<30%) y diabetes

Indicaciones dietéticas

Reducción del exceso de peso. Regulación del aporte de glucosa (Diabetes mellitus), solo en caso de peso corporal normal. Mantenimiento del peso tras adelgazamiento. Colitis con respuesta a la fibra. Estreñimiento.

Beneficios clave

Baja densidad energética. Restricción moderada de la ración diaria. Mejora el cociente masa magra / masa grasa. Elevada palatabilidad. Bajo índice glucémico y azúcares totales.

Propiedades nutricionales

Quemador de grasa. Aumento del consumo de agua. Favorece la dilución urinaria. Aporte proteínico (44%). Materia grasa bruta (13%). Fibras incrementadas. Estado del pelo. Adecuada para gatos adultos y sénior.

Ingredientes funcionales

Fibra de *psyllium*, fructooligosacáridos, quitosán, extracto de hojas de alcachofa deshidratadas, *Lactobacillus acidophilus* pasteurizados.

Presentaciones

Sacos de 1,5 kg y 3 kg.

Contraindicaciones Crecimiento. Gestación y lactación. Enfermedad renal crónica.





KIDNEY • K1 Kidney support

Insuficiencia renal

Indicaciones dietéticas

Ayuda a la función renal en caso de enfermedad renal crónica (o aguda). Trastornos hepáticos crónicos.

Beneficios clave

Aporte reducido de fósforo. Nivel restringido de proteínas. Quelante de fósforo. Elevada densidad energética y palatabilidad. Contenido elevado de EPA+DHA.

Propiedades nutricionales

Incrementa la actividad antioxidante. Aporte proteínico (30%). Materia grasa bruta (21%). Limita los riesgos de enfermedad del tracto urinario inferior. Limita los riesgos de ulceraciones digestivas. Limita los riesgos de acidosis metabólica. Limita los riesgos de hiperparatiroidismo. Limita los riesgos de hipopotasemia. Adecuada para gatos adultos y sénior.

Ingredientes funcionales

Fructooligosacáridos, quitosán, extracto de hojas de alcachofa deshidratadas, *Lactobacillus acidophilus* pasteurizados.

Presentaciones

Sacos de 1,5 kg y 3 kg.

Contraindicaciones Crecimiento. Gestación y lactación.





GASTRO • G1 Digestive support

Enfermedades digestivas

Indicaciones dietéticas

Compensación de las alteraciones de la digestión, reducción de los trastornos agudos de la absorción intestinal e insuficiencia pancreática exocrina crónica. Recuperación nutricional y convalecencia. Gastritis, enteritis y colitis. Megacolon. Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Recuperación después de una cirugía digestiva. Convalecencia. Recuperación después de un periodo de anorexia.

Beneficios clave

Promueve la recuperación nutricional. Fórmula poco alergénica. Elevada energía y concentración. Baja en almidón (13% como materia bruta). Digest Plus Complex.

Propiedades nutricionales

Aumento del consumo de agua. Soporte al efecto barrera digestiva. Inmunidad potenciada. Aporte proteínico (44%). Materia grasa bruta (21%). Elevada palatabilidad. Adecuada para gatos adultos y sénior.

Ingredientes funcionales

Fibra de *psyllium*, fructooligosacáridos, quitosán, nucleótidos de levaduras, betaglucano de levaduras, sales de butirato, *Lactobacillus acidophilus* pasteurizado.

Presentaciones

Sacos de 1,5 kg y 3 kg.

Contraindicaciones Enfermedad renal crónica. Insuficiencia cardíaca.





ALLERGY • A2 Hypoallergy Intolerancia alimentaria

Con proteína hidrolizada de salmón

Indicaciones dietéticas

Alimento dietético completo para gatos que sufren intolerancia/alergia alimentaria con trastornos cutáneos y/o digestivos asociados. Puede utilizarse para diagnóstico (ensayo de eliminación) y para el manejo a largo plazo.

Beneficios clave

Dieta de eliminación. Fuente purificada de hidratos de carbono (única fuente). Con proteína de salmón hidrolizada. Alta tolerancia digestiva. Elevada palatabilidad.

Ingredientes funcionales

Montmorillonita (0,5 %), *Lactobacillus acidophilus* pasteurizado (7 mg/kg), quitosán (800 mg/kg), extracto de hoja de alcachofa deshidratada (540 mg/kg), L-carnitina (540 mg/kg).

Presentaciones

Sacos de 3 kg.





DERMATOLOGY • D1 Dermatology support

Enfermedades de la piel y el pelo

Indicaciones dietéticas

Apoyo de la función dérmica en caso de dermatosis y pérdida excesiva de pelo. Dermatitis. Prurito.

Beneficios clave

Mejora el estado del pelo. Rica en proteínas y aminoácidos azufrados. Derma Plus Complex. Niveles elevados de ácidos grasos esenciales. Soporte de la barrera cutánea.

Propiedades nutricionales

Modula la inflamación. Aporte proteínico (44%). Materia grasa bruta (17,5%). Elevada digestibilidad y tolerancia digestiva. Fórmula poco alergénica. Apoyo inmunitario. Adecuada para todas las etapas de la vida.

Ingredientes funcionales

Semilla de borraja, fibra de *psyllium*, fructooligosacáridos, quitosán, extracto de hojas de alcachofa deshidratadas, *Lactobacillus acidophilus* pasteurizados.

Presentaciones

Sacos de 3 kg.

Contraindicaciones Enfermedad renal crónica.





WEIGHT • W1 Weight loss & diabetes

Obesidad (>30%) y diabetes

Indicaciones dietéticas

Reducción del exceso de peso. Regulación del aporte de glucosa (Diabetes mellitus), solo en caso de obesidad asociada. Colitis con respuesta a la fibra. Estreñimiento. Trastornos del metabolismo de los lípidos (hiperlipidemia).

Beneficios clave

Baja densidad energética. Aporte proteínico (36%). Materia grasa bruta (11,5%). Soporte articular. Mejora el cociente masa magra / masa grasa. Contenido elevado de fibra bruta que mejora la saciedad. Bajo índice glucémico y azúcares totales.

Propiedades nutricionales

Quemador de grasa. Niveles incrementados de vitaminas y elementos traza (15%). Palatabilidad controlada. Adecuada para perros adultos y sénior.

Ingredientes funcionales

Fibra de *psyllium*, fructooligosacáridos, quitosán, *Lactobacillus acidophilus* pasteurizados, condroitín sulfato.

Presentaciones

Sacos de 3 kg y 12 kg.

Contraindicaciones Crecimiento. Gestación y lactación. Enfermedad renal crónica.





WEIGHT • W2 Weight loss & control

Sobrepeso (<30 %) y diabetes

Indicaciones dietéticas

Reducción del exceso de peso. Regulación del aporte de glucosa (Diabetes mellitus), solo en caso de peso corporal normal. Mantenimiento del peso tras adelgazamiento. Colitis con respuesta a la fibra. Estreñimiento.

Beneficios clave

Baja densidad energética. Aporte proteínico (34%). Materia grasa bruta (13%). Restricción moderada de la ración diaria. Mejora el cociente masa magra / masa grasa. Elevada palatabilidad. Bajo índice glucémico y azúcares totales.

Propiedades nutricionales

Quemador de grasa. Fibras incrementadas. Estado del pelo. Adecuada para perros adultos y sénior.

Ingredientes funcionales

Fibra de *psyllium*, fructooligosacáridos, quitosán, *Lactobacillus acidophilus* pasteurizados.

Presentaciones

Sacos de 3 kg y 12 kg.



Contraindicaciones Crecimiento. Gestación y lactación. Enfermedad renal crónica.

JOINT • J1 Joint & Mobility

Enfermedades osteoartrosicas



Indicaciones dietéticas

Apoyo del metabolismo de las articulaciones en caso de osteoartritis. Trastornos articulares. Mejora de la movilidad. Control del peso corporal.

Beneficios clave

Conservación de la masa muscular. Contenido elevado de omega-3 y EPA. Control del peso corporal. Mobility Plus Complex.

Propiedades nutricionales

Antioxidantes añadidos. Aporte proteínico (34%). Materia grasa bruta (15%). Protección de la mucosa digestiva. Alta tolerancia digestiva. Elevada palatabilidad. Adecuada para perros adultos y sénior.

Ingredientes funcionales

Fibra de *psyllium*, fructooligosacáridos, quitosán, condroitín sulfato, *Lactobacillus acidophilus* pasteurizado.

Presentaciones

Sacos de 3 kg y 12 kg.



Contraindicaciones Crecimiento. Gestación y lactación. Enfermedad renal crónica.

ALLERGY • A2 Hypoallergy Intolerancia alimentaria Con proteína hidrolizada de salmón



Indicaciones dietéticas

Alimento dietético completo para perros que sufren intolerancia/alergia alimentaria con trastornos cutáneos y/o digestivos asociados. Puede utilizarse para diagnóstico (ensayo de eliminación) y para el manejo a largo plazo.

Beneficios clave

Dieta de eliminación. Fuente purificada de hidratos de carbono (única fuente). Con proteína de salmón hidrolizada. Alta tolerancia digestiva. Elevada palatabilidad.

Ingredientes funcionales

Montmorillonita (0,5 %), *Lactobacillus acidophilus* pasteurizado (7 mg/kg), L-carnitina (330 mg/kg).

Presentaciones

Sacos de 3 kg, 7 kg y 12 kg.





DERMATOLOGY • D1 Dermatology support

Enfermedades de la piel y el pelo

Indicaciones dietéticas

Apoyo de la función dérmica en caso de dermatosis y pérdida excesiva de pelo. Problemas inflamatorios de la piel, dermatitis, dermatitis atópica. Prurito.

Beneficios clave

Mejora el estado del pelo. Rica en proteínas y aminoácidos azufrados. Derma Plus Complex. Niveles elevados de ácidos grasos esenciales. Soporte de la barrera cutánea.

Propiedades nutricionales

Modula la inflamación. Aporte proteínico (34%). Materia grasa bruta (18%). Elevada digestibilidad y tolerancia digestiva. Fórmula poco alergénica. Soporte inmunitario. Adecuada para perros adultos y sénior.

Ingredientes funcionales

Fructooligosacáridos, fibra de *psyllium*, semilla de borraja, *Lactobacillus acidophilus* pasteurizados.

Presentaciones

Sacos de 3 kg, 7 kg y 12 kg.

Contraindicaciones Enfermedad renal crónica.





GASTRO • G1 Digestive support

Enfermedades digestivas

Indicaciones dietéticas

Compensación de las alteraciones de la digestión, reducción de los trastornos agudos de la absorción intestinal e insuficiencia pancreática exocrina crónica. Recuperación nutricional y convalecencia. Gastritis, enteritis y colitis. Megacolon. Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Recuperación después de una cirugía digestiva. Convalecencia. Recuperación después de un periodo de anorexia.

Beneficios clave

Promueve la recuperación nutricional. Fórmula poco alergénica. Elevada energía y concentración. Baja en almidón (13% como materia bruta). Digest Plus Complex.

Propiedades nutricionales

Aumento del consumo de agua. Soporte al efecto barrera digestiva. Aporte proteínico (34%). Materia grasa bruta (22%). Inmunidad potenciada. Elevada palatabilidad. Adecuada para perros adultos y sénior.

Ingredientes funcionales

Fibra de *psyllium*, fructooligosacáridos, nucleótidos de levaduras, betaglucano de levaduras, sales de butirato, *Lactobacillus acidophilus* pasteurizado.

Presentaciones

Sacos de 1,5 kg, 3 kg y 12 kg.

Contraindicaciones Enfermedad renal crónica. Insuficiencia cardíaca.





KIDNEY • K1 Kidney support

Insuficiencia renal

Indicaciones dietéticas

Ayuda a la función renal en caso de enfermedad renal crónica (o aguda). Trastornos hepáticos crónicos.

Beneficios clave

Aporte reducido de fósforo. Nivel restringido de proteínas.
Quelante de fósforo. Elevada densidad energética y palatabilidad.
Contenido elevado de EPA+DHA.

Propiedades nutricionales

Incrementa la actividad antioxidante. Aporte proteínico (20,5%).
Materia grasa bruta (22%). Limita los riesgos de ulceraciones digestivas. Limita los riesgos de acidosis metabólica.
Limita los riesgos de hiperparatiroidismo. Limita los riesgos de hipopotasemia. Limita el riesgo de enfermedad del tracto urinario inferior. Adecuada para perros adultos y sénior.

Ingredientes funcionales

Fructooligosacáridos, quitosán, *Lactobacillus acidophilus* pasteurizados.

Presentaciones

Sacos de 3 kg y 12 kg.

Contraindicaciones Crecimiento. Gestación y lactación. Hiperpotasemia.



UROLOGY • U1 Dissolution & prevention

Cálculos de estruvita u oxalato cálcico



Indicaciones dietéticas

Disolución de cálculos de estruvita, prevención de la reaparición de cálculos de estruvita y reducción de la formación de cálculos de oxalato.

Beneficios clave

RSS<1 para estruvita. Aumento del consumo de agua.
Optimiza el pH urinario. Contenido elevado de EPA+DHA.
Aporte reducido de fósforo y calcio.

Propiedades nutricionales

Adición de un inhibidor de oxalato. RSS<10 para oxalato.
Aporte proteínico (34%). Materia grasa bruta (17,5%).
Elevada palatabilidad. Adecuada para perros adultos y sénior.

Ingredientes funcionales

Fructooligosacáridos, *psyllium*, *Lactobacillus acidophilus* pasteurizados.

Presentaciones

Sacos de 3 kg y 12 kg.

Contraindicaciones Crecimiento. Gestación y lactación. Enfermedad renal crónica. Insuficiencia cardíaca.



NUTRIBOUND

Solución oral palatable para perros o gatos



Composición

Ingredientes: carnes y derivados animales, derivados de origen vegetal, aceites y grasas, minerales, inulina de achicoria y oligofructosa.

Indicaciones

Asociación de ingredientes esenciales para la alimentación progresiva en periodos de recuperación.

Propiedades nutricionales

Nutribound™ es una fórmula líquida altamente palatable y lista para su uso. La asociación de los ingredientes esenciales estimula al animal a beber y comer hasta el retorno a su dieta habitual.

Posología y modo de empleo

Al abrir la botella por primera vez, desenroscar el tapón blanco y quitar el film de seguridad. Agitar bien antes de usar.

Puede administrarse directamente o mezclado con la bebida o la comida, en una jeringa o en un tubo de alimentación.

Dosis diaria en gatos: 6 ml/kg. Dosis diaria en perros menores de 10 kg: 15-30 ml; perros de 10 a 20 kg: 30-50 ml; perros mayores de 20 kg: 50-70 ml.

Presentación

Caja con 3 botellas de 150 ml.



NUTRIBOUND

Solución oral palatable para perros o gatos



Ingredientes

Arginina	Aminoácido, precursor del óxido nítrico con importante papel en la función inmune, curación de heridas y división celular.
Taurina	Substancia orgánica con propiedades antioxidantes y esenciales para el sistema cardiovascular, músculo-esquelético, retina y sistema nervioso central.
Glutamina	Papel importante en el mantenimiento de la integridad del tracto gastrointestinal y en el sistema inmune.
Ácidos grasos esenciales (Omega 3 y Omega 6)	Estos ácidos grasos se requieren en procesos biológicos como la formación de esteroides y fosfolípidos, el crecimiento y reparación celular, y para la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos.
Prebióticos (Inulina, Oligofructosa)	Los prebióticos son fibras solubles naturales que se encuentran en baja concentración en ciertas plantas. Estimulan el crecimiento y la actividad de las bacterias beneficiosas para la salud en el sistema digestivo.
Vitaminas	Compuestos orgánicos vitales requeridos por el organismo que deben obtenerse de la dieta o de suplementos específicos.

NUTRI-PLUS GEL

Complemento nutricional vitamínico-mineral de alta energía en pasta oral



Composición

Lípidos, proteínas, azúcares naturales, vitaminas y minerales. Altamente energético (18,4 MJ/kg)

Indicaciones

Indicado como suplemento durante esfuerzos físicos intensos (caza, perros de trabajo) o en casos de situaciones fisiológicas especiales que requieran más energía (convalecencia, crecimiento de animales jóvenes, hembras gestantes y lactantes...).

Propiedades

Suplemento ideal cuando se requiere un incremento en el aporte de energía. Debido a su sabor resulta de gran ayuda en aquellas situaciones en las que el apetito se ve disminuido. Fácil administración gracias a la cánula semi-rígida incluida en el envase.

Posología y modo de empleo

Administrar una cucharadita (6 g) de Nutri-plus gel por 5 kg de peso, dos veces al día. Para facilitar la administración, poner una pequeña cantidad en la boca del animal antes de proceder con la dosis recomendada. Nutri-plus gel puede administrarse directamente en la boca con la cánula o mezclarse con la ración diaria. Nutri-plus gel puede administrarse hasta la completa recuperación del animal o durante el periodo de duración del esfuerzo físico.

Presentación

Tubo con 120 g.



Observaciones Conservar en lugar fresco y seco.

PRONEFRA

Alimento dietético complementario en suspensión oral palatable



Composición

Carbonato cálcico. Carbonato magnésico. Quitosán. Polisacáridos de *Astragalus*. Oligopéptidos marinos.

Indicaciones

Ayuda a la función renal en caso de enfermedad renal crónica para disminuir la absorción intestinal del fósforo y las toxinas urémicas, contribuir al mantenimiento de una presión arterial equilibrada y reducir la progresión de cambios fibróticos.

Posología y modo de empleo

Agitar antes de usar. Administrar dos veces al día, preferiblemente mezclado con las comidas, utilizando la jeringa dosificadora (gatos: 1 ml/4 kg dos veces al día; perro: 1 ml/5 kg dos veces al día). Pronefra® es altamente palatable y permite una fácil administración.

Presentaciones

60 ml para gatos.

180 ml para gatos y perros.

Observaciones No exceder la dosis recomendada. Los animales deberán tener acceso libre al agua.
Nº de registro No precisa.



ETOLOGÍA

 Anxitane



ANXITANE

Comprimidos palatables de té verde para manejar el estrés



Composición

Contiene L-teanina procedente de concentrado natural de té verde.

Indicaciones

Ayuda a mantener la calma y la relajación en perros y gatos. Disminuye las reacciones frente al estrés y al miedo, asociados o no a cambios ambientales (miedo a los seres humanos, a otros animales, a salir de casa, cambios en la casa, pirotecnia). Una solución segura y natural con doble acción: relaja sin causar somnolencia y favorece la concentración mental y el aprendizaje.

Propiedades

Comprimidos tan palatables que pueden ser utilizados como premio para perros y gatos. Útil para reforzar el vínculo entre el propietario y su mascota. Al favorecer el aprendizaje, Anxitane es de gran apoyo para un programa de modificación de la conducta. No induce somnolencia. Es seguro y no adictivo.

Posología y modo de empleo

Para un resultado óptimo, administrar Anxitane dos veces al día durante 2 meses, repitiendo si es necesario. No exceder la dosis diaria recomendada.

Gatos y perros de menos de 10 kg: ½ comprimido de Anxitane S mañana y tarde.

Perros entre 10 y 25 kg: ½ comprimido de Anxitane M/L mañana y tarde.

Perros de más de 25 kg: 1 comprimido de Anxitane M/L mañana y tarde.

Presentaciones

Anxitane S, 30 comprimidos.

Anxitane M/L, 30 comprimidos.



Observaciones Mantener alejado del calor y de la humedad.

DIAGNÓSTICO

Enf. infecciosas felinas

- ☑ Speed Duo FeLV/FIV
- ☑ Speed F-Corona

Enf. infecciosas caninas

- ☑ Speed Parvo

Enf. parasitarias y transmitidas por vectores

- ☑ Speed Duo Leish K/Ehrli
- ☑ Speed Leish K
- ☑ Speed Ehrli
- ☑ Speed Giardia
- ☑ Speed Diro

Dermatología y antibiograma

- ☑ Dermatophytest
- ☑ Speed Biogram

Reproducción

- ☑ Ovulation Test
- ☑ Odelis CPSE

Biomarcadores

- ☑ Speed cCRP
- ☑ Speed Cortisol
- ☑ Speed CPSE
- ☑ Speed Progesterone
- ☑ Speed T4
- ☑ Speed Reader

SPEED Duo FeLV/FIV

Detección rápida combinada de antígenos P27 del FeLV y anticuerpos específicos frente a la glicoproteína GP40 del FIV



Método Inmunocromatografía de membrana.

Análisis

Prueba específica combinada para antígenos P27 de la cápside del FeLV y anticuerpos específicos frente a la glicoproteína GP40 del FIV.

Muestra Suero, plasma o sangre entera.

Preparación y lectura 2 y 15 minutos, respectivamente.

Conservación 24 meses a temperatura ambiente entre 2 y 30 °C.

Presentación 6 y 20 unidades.

Fiabilidad*

FeLV (frente al aislamiento del virus): sensibilidad 94,7% y especificidad 99,2%. FIV (frente a Western Blot): sensibilidad 96,3% y especificidad 98,9%.

* Comparado con las técnicas de referencia.

Nº de registro Speed Duo FeLV/FIV 1992-RD.





SPEED F-Corona

Prueba de diagnóstico rápido para anticuerpos frente a coronavirus felino

Método

Inmunocromatografía de membrana.

Análisis

Detección de anticuerpos específicos frente a la proteína N, presente de forma natural en la pared de los coronavirus.

Muestra

Suero, plasma o sangre entera. Líquido ascítico.

Preparación y lectura

2 y 15 minutos, respectivamente.

Conservación

24 meses a temperatura ambiente entre 2 y 30 °C.

Presentación

6 unidades.

Fiabilidad*

Inmunofluorescencia indirecta: sensibilidad 96,5% y especificidad 100%.

* Comparado con la técnica de referencia.

Nº de registro Speed F Corona 1991-RD.





SPEED Parvo

Detección rápida de antígenos de Parvovirus canino

Método

Inmunocromatografía de membrana.

Análisis

Detección de antígenos específicos de Parvovirus canino.

Muestra

Heces.

Preparación y lectura

2 y 10 minutos, respectivamente.

Conservación

24 meses a temperatura ambiente entre 2 y 30 °C.

Presentación

5 unidades.

Fiabilidad*

ELISA en laboratorio: sensibilidad 97% y especificidad 100%.

* Comparado con la técnica de referencia.

Nº de registro Speed Parvo 1990-RD.



SPEED Duo Leish K/Ehrli

Detección rápida combinada de anticuerpos circulantes específicos frente a kinesinas de *Leishmania infantum* y frente a *Ehrlichia canis*



Método

Inmunocromatografía de membrana.

Análisis

Prueba combinada para anticuerpos circulantes específicos frente a kinesinas de *Leishmania infantum* y anticuerpos frente a *Ehrlichia canis*.

Muestra Suero, plasma o sangre entera.

Preparación y lectura 2 y 15 minutos, respectivamente.

Conservación 24 meses a temperatura ambiente entre 2 y 30 °C.

Presentación 6 y 20 unidades.

Fiabilidad*

Leishmaniosis (frente a IFI):
sensibilidad 96,3% y especificidad 100%.
Ehrlichiosis (frente a IFI):
sensibilidad 87% y especificidad: 95%.

* Comparado con las técnicas de referencia.

Nº de registro Speed Duo Leish K/Ehrli 1994-RD.



SPEED Leish K

Detección rápida de anticuerpos circulantes específicos frente a kinesinas de *Leishmania infantum*



Método

Inmunocromatografía de membrana.

Análisis

Detección de anticuerpos circulantes específicos frente a kinesinas.

Muestra

Suero, plasma o sangre entera.

Preparación y lectura

2 y 15 minutos, respectivamente.

Conservación

24 meses a temperatura ambiente entre 2 y 30 °C.

Presentación

6 y 20 unidades.

Fiabilidad*

Inmunofluorescencia indirecta: sensibilidad 96,3% y especificidad 100%.

* Comparado con la técnica de referencia.

Nº de registro Speed Leish K 1817-RD.



SPEED Ehrli

Detección rápida de anticuerpos circulantes específicos frente a *Ehrlichia canis*



Método

Inmunocromatografía de membrana.

Análisis

Detección de anticuerpos circulantes específicos frente a *Ehrlichia canis*.

Muestra

Suero, plasma o sangre entera.

Preparación y lectura

2 y 15 minutos, respectivamente.

Conservación

24 meses a temperatura ambiente entre 2 y 30 °C.

Presentación

6 unidades.

Fiabilidad*

Inmunofluorescencia: sensibilidad 87% y especificidad 95%.

* Comparado con las técnicas de referencia.

Nº de registro Speed Ehrli 1993-RD.





SPEED Giardia

Detección rápida de antígenos solubles de *Giardia duodenalis*

Método

Inmunocromatografía de membrana.

Análisis

Detección de antígenos solubles de *Giardia duodenalis*.

Muestra

Heces.

Preparación y lectura

5 y 5 minutos, respectivamente.

Conservación

16 meses a temperatura ambiente entre 2 y 30 °C.

Presentación

5 unidades.

Fiabilidad*

ELISA en laboratorio: sensibilidad 95,6% y especificidad 100%.
Umbral de detección: 80 quistes/gramo de heces.

* Comparado con la técnica de referencia.

Nº de registro Speed Giardia 2185-RD.





SPEED Diro

Detección rápida de antígenos circulantes de *Dirofilaria immitis*

Método

Inmunocromatografía de membrana.

Análisis

Detección de antígenos circulantes de *Dirofilaria immitis*.

Muestra

Suero, plasma o sangre entera.

Preparación y lectura

2 y 15 minutos, respectivamente.

Conservación

24 meses a temperatura ambiente entre 2 y 30 °C.

Presentación

6 y 20 unidades.

Fiabilidad*

Knott modificada y ELISA de laboratorio: sensibilidad 95,2% y especificidad 99%.

* Comparado con las técnicas de referencia.

Nº de registro Speed Diro 2184-RD.





DERMATOPHYTEST

Detección de dermatofitos sobre un medio de cultivo selectivo

Método

Cultivo rápido sobre agar-agar DTM (Dermatophyte Test Medium).

Análisis

Detección de hongos patógenos del género *Microsporum* y *Trichophyton* mediante cultivo sobre un medio de agar-agar.

Muestra

Raspado cutáneo, hisopo cutáneo, pelos, plumas.

Preparación y lectura

2 minutos y de 4 a 14 días, respectivamente.

Conservación

16 meses entre 2 y 8 °C.

Presentación

6 unidades.

Nº de registro Dermatophytest 2189-RD.



SPEED Biogram

Test para la identificación de bacterias y pruebas de sensibilidad a antibióticos para infecciones cutáneas, auriculares y urinarias



Método Minibandeja para cultivo.

Análisis

6 bacterias, 1 levadura (*Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Proteus*, *Pseudomonas*, *E. Coli*, *Enterobacteriaceae*, *Malassezia*) y 15 moléculas antibióticas (amoxicilina, amoxicilina+ácido clavulánico, cefalexina, ceftiofur, doxiciclina, flumequina, enrofloxacino, marbofloxacino, espiramicina, clindamicina, neomicina, gentamicina, sulfonamida+trimetropim, ácido fusídico y polimixina B).

Muestra Cualquier muestra cutánea, urinaria o auricular.

Preparación y lectura

Preparación 7 minutos. Lectura: antibiograma 24 horas, identificación 48 horas.

Conservación 16 meses entre 2 y 8 °C.

Presentación 5 unidades.

Fiabilidad*

Cultivo en medio Mueller-Hinton:
índice de concordancia 96% y umbral
de detección $\geq 10^4$ UFC/ml.

* Comparado con el método de referencia.

Nº de registro Speed Biogram 2188-RD.



OVULATION TEST

Prueba rápida semicuantitativa de las concentraciones séricas o plasmáticas de progesterona



Método

ELISA rápido de membrana.

Análisis

Determinación semicuantitativa de las concentraciones séricas o plasmáticas de progesterona.

Muestra

Suero, plasma.

Preparación y lectura

5 y 9 minutos, respectivamente.

Conservación

14 meses entre 2 y 8 °C.

Presentación

6 unidades.

Fiabilidad*

RIA (Radioinmunoensayo): tasa de coincidencia 92%.

* Comparado con el método de referencia.

Nº de registro Ovulation Test 1989-RD.





ODELIS CPSE

Diagnóstico de hiperplasia benigna de próstata en laboratorio

Método

ELISA para realización en laboratorio.

Análisis

Medición de la CPSE (Esterasa específica de la próstata canina - *Canine Prostate Specific Esterase*).

Muestra

Suero o plasma (heparina o EDTA).

Laboratorios colaboradores

Echevarne, Immunovet (Barcelona), Albeitar (Zaragoza), Cedivet (Valencia), Taoro (Tenerife), Facultad de las Palmas de Gran Canaria.


Interpretación

Valor inferior a 50ng/ml de CPSE: negativo. Superior a 70 ng/ml de CPSE: positivo. De 50 a 70 ng/ml: dudoso, confirmar por ecografía o repetir a los 3-6 meses.

Fiabilidad

Sensibilidad del 97,1%; especificidad del 92,7%.

Nº de registro Odelis CPSE 1714-RD.



SPEED cCRP

Determinación cuantitativa de proteína C reactiva canina



Método

Inmunocromatografía para determinación cuantitativa por fluorescencia inducida por láser. Para leer con el analizador Speed Reader.

Indicación

Marcador de la inflamación en tiempo real en el perro.

Muestra

Suero, plasma (heparina-Li).

Tiempo de lectura

10 minutos. No precisa incubación.

Volumen de muestra

10 µl.

Conservación

18 meses entre 2 y 8 °C.

Presentación

Caja con 6 tests.

Fiabilidad

Correlación con ELISA 0.9806.*

Nº de registro 10.668-RD.

*Estudio interno de Virbac.



SPEED Cortisol

Determinación cuantitativa de cortisol circulante



Método

Inmunocromatografía para determinación cuantitativa por fluorescencia inducida por láser. Para leer con el analizador Speed Reader.

Indicación

Detección de los niveles de cortisol en perros.

Muestra

Suero.

Tiempo de lectura

15 minutos (incluyendo 5 minutos de incubación).

Volumen de muestra

50 µl.

Conservación

12 meses entre 2 y 8 °C.

Presentación

Caja con 6 tests.

Fiabilidad

Correlación con quimioluminiscencia 0,9272.*

Nº de registro 10.670-RD.

*S. Loukeri, E. Claret, J. Morlet. *Performance evaluation of an in-clinic immunoassay (Speed Cortisol) for the measurement of circulating cortisol in dogs.* ESVCP Nantes Congress, October 2016.



SPEED CPSE

Determinación cuantitativa de esterasa prostática específica canina circulante



Método

Inmunocromatografía para determinación cuantitativa por fluorescencia inducida por láser.
Para leer con el analizador Speed Reader.

Indicación

Marcador de la hiperplasia benigna de próstata en el perro.

Muestra

Suero, plasma (heparina-Li).

Tiempo de lectura

10 minutos. No precisa incubación.

Volumen de muestra

50 µl.

Conservación

18 meses entre 2 y 8 °C.

Presentación

Caja con 6 tests.

Fiabilidad

Correlación con ELISA 0,9703.*

Nº de registro 10.669-RD.

*Estudio interno de Virbac.



SPEED Progesterone

Determinación cuantitativa de progesterona canina



Método

Inmunocromatografía para determinación cuantitativa por fluorescencia inducida por láser. Para leer con el analizador Speed Reader.

Indicación

Orientación sobre el momento óptimo para la inseminación o la monta.

Muestra

Suero, plasma (heparina-Li).

Tiempo de lectura

15 minutos. No precisa incubación.

Volumen de muestra

100 µl.

Conservación

18 meses entre 2 y 8 °C.

Presentación

Caja con 6 tests.

Fiabilidad

Correlación con quimioluminiscencia 0,9338.*

Nº de registro 10.666-RD.

*Estudio interno de Virbac.



SPEED T4

Determinación cuantitativa de tiroxina total circulante (TT4)



Método

Inmunocromatografía para determinación cuantitativa por fluorescencia inducida por láser.
Para leer con el analizador Speed Reader.

Indicación

Detección de los niveles de tiroxina total en perros y en gatos.

Muestra

Suero, plasma (heparina-Li).

Tiempo de lectura

15 minutos (incluyendo 5 minutos de incubación).

Volumen de muestra

50 µl.

Conservación

18 meses entre 2 y 8 °C.

Presentación

Caja con 6 tests.

Fiabilidad

Correlación con quimioluminiscencia 0,9109 en el perro
y 0,9595 en el gato.*

Nº de registro 10.667-RD.

*B. Rannou. Evaluation of a new point-of-care immunoassay (Speed™ T4) in the measurement of feline and canine total thyroxine. ESVCP Nantes Congress, October 2016.



SPEED Reader

Lector de inmunofluorescencia inducida por láser



Método

Autoanalizador para determinación cuantitativa de biomarcadores caninos y felinos.

Características

- Interfaz de usuario auto-guiada.
- Entrada de datos por pantalla táctil.
- Registro de datos históricos.
- Copia de seguridad en pen drive USB.
- Impresora térmica integrada.
- Tamaño 27 x 22 x 9 cm.
- Baterías de seguridad.
- Temporizador integrado.

Determinaciones

- Tiroxina total en perros y gatos.
- Cortisol en perros.
- Esterasa prostática específica canina.
- Progesterona en perras.
- Proteína C reactiva en perros.



ÍNDICE ALFABÉTICO

Alizin

Antiprogéstgeno en solución inyectable.

Allercalm

Champú calmante, hidratante, reestructurante.

Allerderm spot-on

Reparador dérmico de fácil aplicación.

Allermyl

Champú antiirritante, reestructurante y antiséptico.

Anxitane

Alimento complementario relajante para perros y gatos.

Canigen Cachorros 2b

Vacuna para parvovirus canina. Suspensión inyectable.

Canigen DHPPi

Vacuna para hepatitis, parainfluenza, moquillo y parvovirus canina.

Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable.

Canigen DHPPiL

Vacuna para hepatitis, parainfluenza, moquillo, parvovirus y leptospirosis canina.

Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable.

Canigen L4

Vacuna para Leptospira interrogans serogrupos Canicola,

Icterohaemorrhagiae y Australis y L. kirschneri serogrupo Grippotyphosa.

Suspensión inyectable.

Canigen MHL

Vacuna para hepatitis, moquillo y leptospirosis canina.

Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable.

Canigen MHPL

Vacuna para hepatitis, moquillo, parvovirus y leptospirosis canina.

Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable.

Carprox

Antiinflamatorio.

Champú fisiológico

Champú higienizante de uso frecuente.

Clearium

Champú con clorhexidina al 3%.

Contralac

Antilactógeno en comprimidos orales.

Cortavance

Dermoesteroide en spray.

Cyclavance

Ciclosporina en solución líquida.

Dermatophyttest

Detección de dermatofitos sobre un medio de cultivo selectivo.

Easotic

Suspensión ótica antiinflamatoria y antimicrobiana.

Effipro DUO

Antiparasitario externo en spot on con fipronil y piriproxi-feno.

Effipro spray

Antiparasitario externo en solución para pulverización cutánea.

Effipro spot-on

Antiparasitario externo en solución tópica.

Effitix

Antiparasitario externo en solución oral.

Endogard Sabor comprimidos

Tratamiento de infestaciones por nematodos y cestodos.



ÍNDICE ALFABÉTICO

Enrox Sabor

Enrofloxacinio en comprimidos orales.

Epi-otic

Limpiador auricular antiséptico y queratolítico.

Evicto

Antiparasitario y antihelmíntico de uso tópico.

Feligen CRP

*Vacuna para caliciviriosis, panleucopenia y rinotraqueitis felina.
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable.*

Inflacam / Inflacam inyectable

Antiinflamatorio.

Leucogen

Vacuna para leucemia felina. Suspensión inyectable.

Leucofeligen FeLV/RCP

*Vacuna para caliciviriosis, panleucopenia, rinotraqueitis y leucemia felina.
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable.*

Limpiador auricular

Limpiador ótico en solución.

Medetor 1 mg/ml

Sedante-hipnótico en solución inyectable.

Milpro

Antiparasitario interno en comprimidos.

Milteforan 20 mg/ml

Control de la leishmaniosis en solución oral.

Nutribound

Suplemento nutricional en solución oral palatable.

Nutri-plus gel

Complemento nutricional vitamínico-mineral de alta energía en pasta oral.

Odelis CPSE

Diagnóstico de hiperplasia benigna de próstata en laboratorio.

Ovulation Test

Prueba rápida semicuantitativa de las concentraciones séricas o plasmáticas de progesterona.

Parvigen

Vacuna para parvovirus canina. Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable.

Prevender

Collar antiparasitario.

Prevendog

Collar antiparasitario para perros.

Pronefra

Alimento dietético complementario en suspensión oral palatable.

Rabigen

Vacuna para rabia (perros y gatos). Suspensión inyectable.

Revertor

Antisedante en solución inyectable.

Rilexine comprimidos masticables

Antibacteriano en comprimidos orales.

Sebomild

Champú antiséptico, queratolítico y antiséptico.

Soligental

Antibacteriano en solución oftálmica.



ÍNDICE ALFABÉTICO

Speed Biogram

Test para la identificación de bacterias y pruebas de sensibilidad a antibióticos para infecciones cutáneas, auriculares y urinarias.

Speed cCRP

Determinación cuantitativa de proteína C reactiva canina.

Speed Cortisol

Determinación cuantitativa de cortisol circulante.

Speed CPSE

Determinación cuantitativa de esterasa prostática específica canina circulante.

Speed Diro

*Detección rápida de antígenos circulantes de *Dirofilaria immitis*.*

Speed Duo FeLV/FIV

Detección rápida combinada de antígenos P27 del FeLV y anticuerpos específicos frente a la glicoproteína GP40 del FIV

Speed Duo Leish K/Ehrli

*Detección rápida combinada de anticuerpos circulantes específicos frente a kinesinas de *Leishmania infantum* y frente a *Ehrlichia canis*.*

Speed Ehrli

*Detección rápida de anticuerpos circulantes específicos frente a *Ehrlichia canis*.*

Speed F-Corona

Prueba de diagnóstico rápido para anticuerpos frente a coronavirus felino.

Speed Giardia

*Detección rápida de antígenos solubles de *Giardia duodenalis*.*

Speed Leish K

*Detección rápida de anticuerpos circulantes específicos frente a kinesinas de *Leishmania infantum*.*

Speed Parvo

Detección rápida de antígenos de Parvovirus canino.

Speed Progesterone

Determinación cuantitativa de progesterona canina.

Speed Reader

Lector de inmunofluorescencia inducida por láser.

Speed T4

Determinación cuantitativa de tiroxina total circulante (TT4).

Stelfonta

Solución inyectable para el tratamiento de mastocitomas en perros.

Suprelorin

Implante subcutáneo para esterilización médica reversible.

Tramvetol 50 mg

Comprimidos masticables para el dolor agudo y crónico leve en perros.

Tramvetol 50 mg/ml

Solución inyectable para el dolor postoperatorio leve en perros.

Veggiedent FR3SH

Lámina masticable contra la formación de la placa dental y el sarro.

Veggiedent Zen

Láminas masticables contra la formación de la placa dental y del sarro que proporcionan bienestar a perros inquietos.

Vet aquadent

Solución contra la placa dental para el agua de bebida con xilitol y clorhexidina.



ÍNDICE ALFABÉTICO

Veterinary HPM

Gatos esterilizados

Adult Neutered Cat
Adult with Salmon Neutered & Entire Cat
Baby Pre Neutered Cat
Junior Neutered Cat
Senior Neutered Cat

Perros esterilizados

Adult Neutered Dog Large & Medium
Adult Neutered Dog Small & Toy
Adult Neutered Sensitive Digest Dog Large & Medium
Senior Neutered Dog Large & Medium
Senior Neutered Dog Small & Toy

Perros grandes y medianos

Adult Dog Large & Medium
Adult Sensitive Digest Large & Medium
Baby Dog Large & Medium
Junior Dog Special Large
Junior Dog Special Medium
Senior Dog Large & Medium

Perros pequeños y miniatura

Adult Dog Small & Toy
Baby Dog Small & Toy
Senior Dog Small & Toy

Veterinary HPM Dietetic Range

A2. Hypoallergy Food intolerance Cat
A2. Hypoallergy Food intolerance Dog
D1. Dermatology support Cat
D1. Dermatology support Dog
G1. Digestive support Cat
G1. Digestive support Dog
J1. Joint & Mobility Dog

K1. Kidney support Cat
K1. Kidney support Dog
U1. Dissolution & prevention Dog
U1. Struvite dissolution Cat
U2. Dissolution & prevention Cat
U3. Urinary WIB Cat
W1. Weight loss & diabetes Cat
W1. Weight loss & diabetes Dog
W2. Weight loss & control Cat
W2. Weight loss & control Dog

Vetemex

Tratamiento y prevención de vómitos y náuseas en perros y gatos.

Vetflurane

Inducción y mantenimiento de la anestesia general.

Virbagen Omega

*Interferón Omega de origen felino.
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable.*

Virbaminthe

Antihelmíntico en pasta oral.

Ypozane

Antiandrógeno en comprimidos.

Zoletil

Anestésico general en solución extemporánea inyectable.

